

MT90/91-Fonctions d'une variable réelle

Chapitre 4 : Limites et continuité

Équipe de Mathématiques Appliquées

UTC

avril 2011



Chapitre IV

Limites et continuité

IV.1	Limites	3
IV.2	Continuité d'une fonction	21

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1 Limites

IV.1.1	Voisinage d'un point	4
IV.1.2	Définition de la limite	5
IV.1.3	Limites à gauche, à droite, à l'infini	7
IV.1.4	Caractérisation de la limite par les suites	9
IV.1.5	Propriétés des limites liées aux comparaisons des fonctions	12
IV.1.6	Opérations sur les limites	15
IV.1.7	Définition des limites généralisées	17
IV.1.8	Opérations sur les limites généralisées	18

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1.1 Voisinage d'un point

Exercices :

[Exercice A.1.1](#)

Soit D le domaine de définition d'une fonction f d'une variable réelle. En pratique, ce domaine est très souvent constitué de la réunion d'un nombre fini d'intervalles. Nous allons nous intéresser au comportement de f , lorsque le point x de D se rapproche d'un point a de \mathbb{R} .

Pour faire cette étude, il faut donner un sens précis à cette notion intuitive exprimée par l'expression 'se rapproche'. Ceci nous conduit à introduire la notion de **voisinage** de a que nous définissons par :

Définition IV.1.1. On appelle **voisinage** de $a \in \mathbb{R}$ toute partie de \mathbb{R} qui contient un intervalle de la forme $]a - \alpha, a + \alpha[$ avec $\alpha > 0$. On appelle **voisinage de a dans D** toute intersection de D avec un voisinage de a dans \mathbb{R} .

Par exemple un voisinage de 0 est $] - 1, 1[$ ou $[-1, 0.5]$ ou $[-1000, +0.001[$ mais par contre $[-1, 0]$ n'est pas un voisinage de 0 car il n'existe aucun réel α strictement positif tel que l'intervalle $] - \alpha, \alpha[$ soit contenu dans $[-1, 0]$.

Lorsque l'on parle de limite ou de continuité d'une fonction en un point a , c'est le comportement de la fonction dans un voisinage de a qui est important et non pas dans son domaine de définition tout entier. De manière générale, on dit qu'une propriété est **locale** si elle est vraie dans un voisinage d'un point contrairement à une propriété **globale** qui est valable pour tout réel.

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1.2 Définition de la limite

Exercices :

[Exercice A.1.2](#)

[Exercice A.1.3](#)

[Exercice A.1.4](#)

Pour étudier la limite d'une fonction en a il n'est pas nécessaire que la fonction f soit définie au point a considéré. Par exemple, il est tout à fait légitime, de s'intéresser au comportement au voisinage de 0, de la **fonction de Heaviside**, encore appelée **échelon unité** définie par :

$$H(x) = \begin{cases} 0, & \text{pour } x < 0, \\ 1, & \text{pour } x > 0. \end{cases}$$

La valeur de H en 0 n'est pas donnée, mais nous allons voir que cela n'empêche absolument pas l'étude du comportement de H au voisinage de 0

Définition IV.1.2. Soient Ω un intervalle ouvert de \mathbb{R} , a un point de Ω et f une fonction numérique définie sur Ω sauf éventuellement en a . On dit que $f(x)$ **tend vers l quand x tend vers a** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \{(0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon)\}. \quad (\text{IV.1.1})$$

On dit aussi que l est la **limite de f en a** et on note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l.$$

On obtient une définition équivalente en remplaçant les inégalités strictes par des inégalités larges. Plus précisément, on peut montrer que la définition ci-dessous :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \{(0 < |x - a| \leq \eta) \Rightarrow (|f(x) - l| \leq \varepsilon)\}. \quad (\text{IV.1.2})$$

est équivalente à la précédente. L'exemple de la fonction de Heaviside définie plus haut, montre pourquoi nous avons maintenu une inégalité stricte $0 < |x - a|$. C'est nécessaire, si l'on ne veut pas imposer à la fonction considérée d'être définie en a .

À titre d'exemple, étudions la fonction numérique définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = \sqrt{|x|}$. Montrons qu'elle admet en 0 une limite qui est 0. Comme pour les suites, c'est l'écriture de la conclusion qui permet de remonter le raisonnement : on choisit un ε strictement positif quelconque et l'on veut trouver un η strictement positif tel que :

$$(0 < |x| < \eta) \Rightarrow (0 < \sqrt{|x|} < \varepsilon). \quad (\text{IV.1.3})$$

Or, on vérifie sans peine l'implication :

$$(0 < |x| < \varepsilon^2) \Rightarrow (0 < \sqrt{|x|} < \varepsilon) \quad (\text{IV.1.4})$$

Nous voyons qu'il suffit de prendre $\eta \leq \varepsilon^2$, pour obtenir le résultat.

Définition de la limite

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1.3 Limites à gauche, à droite, à l'infini

Exercices :

[Exercice A.1.5](#)

[Exercice A.1.6](#)

Définition IV.1.3. Soient Ω un intervalle de \mathbb{R} , a un point de Ω et f une fonction numérique définie sur Ω sauf éventuellement en a . On dit que la fonction f admet une **limite à droite** en a s'il existe un nombre l tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \{(a < x < a + \eta) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon)\}.$$

On notera $f(a + 0)$ ou simplement $f(a+)$ la limite à droite.

On définit de façon analogue la **limite à gauche** de f en a et on notera $f(a - 0)$ ou simplement $f(a-)$ la limite à gauche. Par exemple la fonction \sqrt{x} admet en 0 une limite à droite égale à 0. Ce n'est qu'une limite à droite puisque cette fonction n'est définie que sur $[0, +\infty[$.

De même, la fonction de Heaviside définie au paragraphe précédent, admet en 0 une limite à droite, égale à +1 et une limite à gauche égale à 0.

Définition IV.1.4. Soit f définie sur $] \omega, +\infty[$, on dit que $f(x)$ **tend vers l quand x tend vers $+\infty$** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \geq \omega, \{(x > A) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon)\}. \quad (\text{IV.1.5})$$

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

On dit aussi que l est la limite de f à l'infini et on note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

De même, si f est définie sur $] -\infty, \omega[$, on dit que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers $-\infty$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \leq \omega, \{(x < A) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon)\}. \quad (\text{IV.1.6})$$

À titre d'exemple, montrons que, quel que soit l'entier p positif, $1/x^p$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Nous voyons en effet que si nous posons, pour ε strictement positif donné, $A = \sqrt[p]{1/\varepsilon}$ alors :

$$(x > A) \Rightarrow \left(\left(\frac{1}{x^p} \right) < \varepsilon \right).$$

Proposition IV.1.1. Une fonction numérique f , définie dans un voisinage de $a \in \mathbb{R}$, admet une limite en a si et seulement si f admet une limite à droite et une limite à gauche en a qui sont égales.

La démonstration est laissée en exercice.

Limites à gauche, à droite, à l'infini

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1.4 Caractérisation de la limite par les suites

Exercices :

[Exercice A.1.7](#)

Documents :

[Document C.1.1](#)

Théorème IV.1.1. Soient $a \in \mathbb{R}$, Ω un intervalle ouvert contenant a et f une fonction numérique définie sur $\Omega \setminus \{a\}$.

Une condition nécessaire et suffisante pour que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ est que : quelle que soit la suite (x_n) , si (x_n) converge vers a , et si $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \in \Omega \setminus \{a\}$, alors la suite $(f(x_n))$ converge vers ℓ .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \left(\forall (x_n) \left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \\ \text{et} \\ \forall n \in \mathbb{N}, x_n \in \Omega \setminus \{a\} \end{array} \right. \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell \right).$$

Démonstration - Tout d'abord, remarquons que lorsqu'une suite (x_n) tend vers a , elle ne parcourt qu'un ensemble discret, c'est-à-dire indexé par \mathbb{N} , de valeurs. Au contraire, lorsque x tend vers a , il parcourt toutes les valeurs réelles au voisinage de a . La convergence pour $x \rightarrow a$ est donc une propriété beaucoup plus forte que la convergence lorsque $x_n \rightarrow a$. Le théorème est quand même vrai, comme nous allons le démontrer, parce que nous demandons que la convergence de $(f(x_n))$ vers ℓ soit effective **pour n'importe quelle suite** (x_n) convergeant vers a .

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

La démonstration d'une condition nécessaire et suffisante comporte toujours deux parties. La condition suffisante est démontré dans le document référencé. Nous allons montrer que la condition est nécessaire. Supposons donc que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l.$$

Cela s'écrit

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in V, \quad (0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon). \quad (\text{IV.1.7})$$

Soit maintenant, (x_n) une suite convergeant vers a , vérifiant en outre $x_n \neq a$. Cela s'explique en

$$\forall \eta > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N) \Rightarrow (0 < |x_n - a| < \eta). \quad (\text{IV.1.8})$$

En regroupant (IV.1.7) et (IV.1.8), nous voyons que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N) \Rightarrow (|f(x_n) - l| < \varepsilon).$$

ce qui montre bien que, quelle que soit la suite (x_n) convergeant vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers l .

Le théorème nous donne un moyen de démontrer que $f(x)$ n'admet pas de limite en a : il suffit en effet d'exhiber *une* suite (x_n) qui tend vers a et telle que $f(x_n)$ ne converge pas. De même, si l'on exhibe *une* suite (x_n) qui tend vers a et telle que $f(x_n)$ ne tend pas vers l , alors f ne tend pas vers l quand x tend vers a .

On a des caractérisations analogues pour les limites à droite (ou à gauche) et les limites à l'infini de f :

Caractérisation de la limite par les suites

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

- Une condition nécessaire et suffisante pour que f admette une **limite à droite** de a égale à l est que, quelle que soit la suite (x_n) , si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ et $x_n > a$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l.$$

- Une condition nécessaire et suffisante pour que f admette une limite égale à l quand x tend vers $+\infty$ est que, quelle que soit la suite (x_n) tendant vers $+\infty$, on ait

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l.$$

Proposition IV.1.2. *La limite d'une fonction en un point, si elle existe, est unique.*

Démonstration - Supposons qu'il existe deux limites l et \hat{l} et soit une suite quelconque (x_n) qui tend vers a . Le théorème précédent dit que la suite $f(x_n)$ tend vers l et vers \hat{l} . Nous savons que c'est impossible puisque nous avons démontré que la limite d'une suite est unique.

Caractérisation de la limite par les suites

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1.5 Propriétés des limites liées aux comparaisons des fonctions

Exercices :

[Exercice A.1.8](#)

[Exercice A.1.9](#)

[Exercice A.1.10](#)

Exemples :

[Exemple B.1.1](#)

Les définitions rigoureuses sont indispensables pour montrer certaines propriétés :

Proposition IV.1.3. *Soient $a \in \mathbb{R}$, Ω un intervalle ouvert contenant a et f une fonction numérique définie sur $\Omega \setminus \{a\}$. Si f admet en a une limite $l > 0$, alors il existe un intervalle ouvert Ω' contenant a tel que :*

$$\forall x \in \Omega' \setminus \{a\}, f(x) > 0.$$

Démonstration - On sait que $\forall \varepsilon > 0$, on peut trouver $\eta > 0$ tel que :

$$\forall x \in \Omega \quad (0 < |x - a| < \eta \Rightarrow l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon)$$

Il suffit de choisir ε vérifiant $l - \varepsilon > 0$ alors si on définit $\Omega' = \Omega \cap]a - \eta, a + \eta[$, on obtient le résultat. Nous pouvons choisir par exemple $\varepsilon = l/2$.

Proposition IV.1.4. *{Théorèmes de comparaison} Soit Ω un intervalle ouvert contenant a . Soient f_1, f_2, f et g des fonctions définies sur $\Omega \setminus \{a\}$.*

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

1. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta \text{ et } \forall x \in \Omega \setminus \{a\} \quad f(x) \leq g(x),$$

alors $\alpha \leq \beta$.

2. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = l \text{ et } \forall x \in \Omega \setminus \{a\}, \quad f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x),$$

alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$. Cette propriété est souvent appelée **théorème des gendarmes**.

3. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ et } \forall x \in \Omega \setminus \{a\} \quad |f(x)| \leq g(x),$$

alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

4. Si f est bornée et si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.

Démonstration -

1. On utilise le résultats sur les suites : quelle que soit la suite (x_n) convergeant vers a , telle que $x_n \in \Omega \setminus \{a\}$, les deux suites $(f(x_n))$ et $(g(x_n))$ sont convergentes respectivement vers α et β , et vérifient $f(x_n) \leq g(x_n)$. Le résultat sur la comparaison des limites des suites permet de conclure.

Attention! Même si $f(x) < g(x), \forall x \in \Omega \setminus \{a\}$, on a encore $\alpha \leq \beta$. Par exemple, nous avons vu que pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $\frac{\sin x}{x} < 1$. Lorsque l'on passe à la limite en 0, on obtient donc $1 \leq 1$ **et non pas** $1 < 1$. Le passage à la limite ne conserve pas l'inégalité stricte.

Propriétés des limites liées aux comparaisons des fonctions

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

2. Quelle que soit la suite (x_n) convergeant vers a , telle que $x_n \in \Omega \setminus \{a\}$, on doit montrer que $f(x_n)$ converge vers l .

Pour ce faire on utilise les propriétés suivantes

$$x_n \in \Omega \setminus \{a\} \Rightarrow f_1(x_n) \leq f(x_n) \leq f_2(x_n)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(x_n) = l$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(x_n) = l$$

Le théorème de comparaison des suites permet de conclure que $f(x_n)$ converge vers l .

3. On utilise le théorème des gendarmes : $-g(x) \leq f(x) \leq g(x)$.
4. On utilise le point précédent : $|f(x)g(x)| \leq M|g(x)|$.

Propriétés des limites liées aux comparaisons des fonctions

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1.6 Opérations sur les limites

Exercices :

[Exercice A.1.11](#)

Exemples :

[Exemple B.1.2](#)

Théorème IV.1.2. Soient f et g définies dans un voisinage de a (sauf éventuellement en a) telles que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$, avec a fini, alors

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = \alpha + \beta$,
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha\beta$,
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$, sous la condition que $\beta \neq 0$.

Ce théorème peut se généraliser au cas où x tend vers l'infini.

Démonstration - C'est une conséquence immédiate du théorème de la caractérisation des limites par les suites, puisque toutes ces propriétés ont été démontrées sur les limites des suites.

Théorème IV.1.3. Soit Ω un intervalle ouvert contenant x_0 , soit f définie sur $\Omega \setminus \{x_0\}$

Soit Ω' un intervalle ouvert contenant y_0 , et soit g définie sur Ω' .

On suppose

$$\text{Im } f \subset \Omega', \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, \quad \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = z_0, \quad \text{et } g(y_0) = z_0,$$

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = z_0.$$

Les théorèmes précédents sont **très importants**, car ils permettent dans la pratique de ramener l'étude d'une limite à des cas déjà connus ou obtenus dans un calcul précédent, sans avoir à remonter chaque fois à la définition, avec des ε, η, \dots

Opérations sur les limites

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.1.7 Définition des limites généralisées

Exercices :

[Exercice A.1.12](#)

Le nom abusif de "limites généralisées" concerne les fonctions qui tendent vers ∞ .

Définition IV.1.5. Soient Ω un intervalle ouvert de \mathbb{R} , a un point de Ω et f une fonction numérique définie sur Ω sauf éventuellement en a . On dit que $f(x)$ **tend vers** $+\infty$ **quand** x **tend vers** a si :

$$\forall A > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \{(0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow (f(x) > A)\}. \quad (\text{IV.1.9})$$

Soit f définie sur $] \omega, +\infty[$, on dit que $f(x)$ **tend vers** $+\infty$ **quand** x **tend vers** $+\infty$ si :

$$\forall A > 0, \exists B \geq \omega, \{(x > B) \Rightarrow (f(x) > A)\}. \quad (\text{IV.1.10})$$

Il est incorrect (et dangereux) d'écrire $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ car il ne s'agit pas d'une limite dans \mathbb{R} et que les propriétés sur les combinaisons de limites ne seront pas toujours valables. Aussi vaut-il mieux écrire

$$f(x) \rightarrow +\infty \text{ quand } x \rightarrow a, \quad f(x) \rightarrow +\infty \text{ quand } x \rightarrow +\infty.$$

Toutefois, cet abus d'écriture est toléré quand il n'y a pas de risque d'ambiguïté dans le contexte où l'on se trouve.

Ces définitions s'étendent sans problème à $-\infty$ puisque si $f(x) \rightarrow -\infty$ alors $-f(x) \rightarrow +\infty$.

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

IV.1.8 Opérations sur les limites généralisées

Exercices :

[Exercice A.1.13](#)

[Exercice A.1.14](#)

[Exercice A.1.15](#)

Théorème IV.1.4. *Soient deux fonctions f et g définies au voisinage de a et telles que $g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$.*

1. *si f est bornée au voisinage de a , alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$,*
2. *si f est minorée au voisinage de a , alors $f(x) + g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$,*
3. *si f est minorée, au voisinage de a , par un réel strictement positif, alors $f(x)g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$,*
4. *si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ et $f(x) > 0$ dans un voisinage de a , alors $\frac{1}{f(x)} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$.*

Démonstration -

1. Soit $\varepsilon > 0$, alors il existe $\eta > 0$ tel que :

$$(0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow (g(x) > \frac{1}{\varepsilon}).$$

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents



Or si $g(x) > \frac{1}{\varepsilon}$, alors $g(x) > 0$ et donc $0 < \frac{1}{g(x)} < \varepsilon$ ce qui démontre le résultat si $f = 1$. Le cas f bornée s'en déduit aisément.

2. Puisque la fonction f est minorée, il existe m tel que $f(x) \geq m$ au voisinage de a . Soit $A > 0$ donné, si on définit $A' = \max(1, A - m)$, alors $A' > 0$, donc il existe $\eta > 0$ tel que :

$$0 < |x - a| < \eta \Rightarrow (g(x) > A' \geq A - m) \Rightarrow f(x) + g(x) > A - m + m = A,$$

d'où le résultat.

3. La démonstration est très semblable à la précédente, elle est laissée en exercice.
4. On a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_1 > 0, \{(0 < |x - a| < \eta_1) \Rightarrow (|f(x)| < \varepsilon)\}.$$

$$\exists \eta_2 > 0, \{(0 < |x - a| < \eta_2) \Rightarrow (f(x) > 0)\}.$$

Donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta = \min\{\eta_1, \eta_2\}, \left\{ (0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow (0 < f(x) < \varepsilon) \Rightarrow \left(0 < \frac{1}{\varepsilon} < \frac{1}{f(x)}\right) \right\}.$$

Donc $\forall A > 0$, posons $\varepsilon = \frac{1}{A}$, si on choisit η_1, η_2, η comme précédemment, on a donc

$$\left\{ (0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow \left(A < \frac{1}{f(x)}\right) \right\}.$$

On doit faire bien attention aux hypothèses de la proposition IV.1.4. Les opérations

$$\frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty$$

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

ne sont pas licites, car peuvent donner lieu à des résultats très différents selon les cas. On dit que ce sont des **formes indéterminées**. Vous verrez en exercice quelques exemples d'indéterminations.

Opérations sur les limites généralisées

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

IV.2 Continuité d'une fonction

IV.2.1	Définition de la continuité	22
IV.2.2	Continuité et limite	24
IV.2.3	Opérations sur les fonctions continues	26
IV.2.4	Théorème de la valeur intermédiaire	28
IV.2.5	Fonctions continues sur un segment	30
IV.2.6	Prolongement par continuité	32
IV.2.7	Continuité uniforme	34
IV.2.8	Fonctions strictement monotones	36

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

IV.2.1 Définition de la continuité

Exercices :

[Exercice A.1.16](#)

[Exercice A.1.17](#)

Exemples :

[Exemple B.1.3](#)

Définition IV.2.1. Soient Ω un intervalle de \mathbb{R} et f une fonction définie sur Ω . On dit que f est **continue au point** $a \in \Omega$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \{(|x - a| < \eta) \Rightarrow (|f(x) - f(a)| < \varepsilon)\}. \quad (\text{IV.2.1})$$

On dit que f est **continue à droite en** a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \{(a \leq x < a + \eta) \Rightarrow (|f(x) - f(a)| < \varepsilon)\}. \quad (\text{IV.2.2})$$

On dit que f est **continue à gauche en** a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \{(a - \eta < x \leq a) \Rightarrow (|f(x) - f(a)| < \varepsilon)\}. \quad (\text{IV.2.3})$$

Enfin on dit qu'une fonction est **continue sur** Ω si elle est continue en tout point de Ω .

Dans cette définition, le nombre η dépend de ε et en général de a .

Par exemple, étudions la continuité de la fonction f définie par $f(x) = x^3$. Nous avons :

$$f(a + h) - f(a) = (a + h)^3 - a^3 = h(3a^2 + 3ah + h^2).$$

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Soit $\alpha > 0$ fixé, alors pour $|h| < \alpha$, nous pouvons écrire :

$$|3a^2 + 3ah + h^2| \leq 3a^2 + 3|a|\alpha + \alpha^2$$

Soit $M = 3a^2 + 3|a|\alpha + \alpha^2$ et soit $\varepsilon > 0$ donné, alors si nous prenons $\eta = \min\{\alpha, \varepsilon/M\}$, nous déduisons de ce qui précède que :

$$(|h| < \eta) \Rightarrow (|(a+h)^3 - a^3| \leq M|h| < \varepsilon).$$

Définition de la continuité

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.2.2 Continuité et limite

Exercices :

[Exercice A.1.18](#)

Proposition IV.2.1. *Une fonction f est continue en $a \in \Omega$ si et seulement si f admet une limite en a égale à $f(a)$. Une fonction f est continue à gauche (resp. à droite) en a si et seulement si f admet une limite à gauche (resp. à droite) en a égale à $f(a)$.*

Démonstration - Ceci provient directement des définitions de la limite et de la continuité d'une fonction en un point. Ceci donne aussi de manière évidente les résultats suivants :

Proposition IV.2.2. *Une fonction f est continue en a si et seulement si elle est continue à droite et continue à gauche en a .*

Théorème IV.2.1. *Une fonction f , définie sur un intervalle Ω , est continue au point $a \in \Omega$ si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de Ω convergeant vers a la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$, c'est-à-dire :*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right) = f(a). \quad (\text{IV.2.4})$$

On peut montrer, en utilisant ce théorème, que la fonction x^p est continue au point $a \in \mathbb{R}$. En effet, soit (x_n) une suite convergeant vers a , alors on sait que le produit des

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

p suites (x_n) converge vers le produit des limites soit a^p et on a donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^p = a^p = f(a).$$

Notons au passage que la définition rigoureuse de la fonction x^p , pour p entier naturel se fait par récurrence :

$$x^p = \begin{cases} x, & \text{lorsque } p = 1, \\ x^{p-1}x, & \text{lorsque } p > 1. \end{cases}$$

Il en va de même de la démonstration de la convergence de la suite $(x_n^p)_{n \in \mathbb{N}}$.

Continuité et limite

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.2.3 Opérations sur les fonctions continues

Exercices :

[Exercice A.1.19](#)

Cours :

[Continuité et limite](#)

Les résultats de ce paragraphe se déduisent de manière immédiate des propriétés sur les limites du paragraphe référencé.

Théorème IV.2.2. *Soient f et g deux fonctions définies dans un voisinage de a et continues au point a . Alors*

1. *la fonction $f + g$ est continue au point a ,*
2. *pour $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction λf est continue au point a ,*
3. *la fonction fg est continue au point a ,*
4. *si $g(a) \neq 0$, la fonction $\frac{1}{g}$ est continue au point a .*

Corollaire IV.2.1. *Si f et g sont continues sur Ω , alors $f + g$, λf , fg sont des fonctions continues sur Ω et $\frac{1}{g}$ est continue en tout point où g ne s'annule pas.*

La fonction identité ($x \mapsto x$) est évidemment continue. On en déduit que les polynômes sont des fonctions continues, les fractions rationnelles sont continues partout sauf aux points annulant le dénominateur.

Théorème IV.2.3. *Soit f une fonction définie dans un voisinage de a et continue en a . Soit g une fonction définie dans un voisinage du point $b = f(a)$ et continue en b . Alors $g \circ f$ définie dans un voisinage de a et est continue au point a .*

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Démonstration - f est définie sur un voisinage de a donc il existe $\alpha > 0$ tel que f soit définie sur $]a - \alpha, a + \alpha[$.

g est définie sur un voisinage de b donc il existe $\beta > 0$ tel que g soit définie sur $]b - \beta, b + \beta[$.

D'autre part puisque f est continue en a

$$\exists \eta > 0, \forall x \in]a - \alpha, a + \alpha[, \{|x - a| < \eta\} \Rightarrow \{|f(x) - f(a)| < \beta\}.$$

Posons $\alpha_0 = \min(\alpha, \eta)$, alors $\forall x \in]a - \alpha_0, a + \alpha_0[, |f(x) - f(a)| < \beta$ donc $f(x) \in]b - \beta, b + \beta[$ donc $g \circ f$ est définie pour tout x appartenant à $]a - \alpha_0, a + \alpha_0[$.

Pour montrer que $g \circ f$ est continue, il suffit alors d'utiliser le théorème (IV.1.3) sur les limites.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{y \rightarrow f(a)} g(y) = g(f(a))$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = g \circ f(a).$$

Opérations sur les fonctions continues

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.2.4 Théorème de la valeur intermédiaire

Exercices :

[Exercice A.1.20](#)

[Exercice A.1.21](#)

Ce théorème formalise la propriété intuitive que lorsque l'on trace au crayon une courbe représentant une fonction continue sur un intervalle, on n'a jamais besoin de lever le crayon. Mathématiquement, cette propriété est intimement liée à la structure de \mathbb{R} , en particulier à la propriété de la borne supérieure.

Proposition IV.2.3. *Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I de \mathbb{R} . Soient a et b deux points de I tels que $a < b$ et $f(a)f(b) < 0$. Alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.*

Démonstration - Pour fixer les idées supposons que $f(a) < 0$ et donc $f(b) > 0$. Considérons l'ensemble

$$G = \{x \in [a, b]; f(x) < 0\}.$$

G n'est pas vide (il contient au moins a), il est majoré par b , il possède donc une borne supérieure $c \leq b$. D'autre part puisque $a \in G$, $a \leq c$.

En conséquence, il existe une suite (x_n) d'éléments de G telle que $x_n \rightarrow c$, et donc $f(x_n) \rightarrow f(c)$. Comme $f(x_n) < 0$, on a $f(c) \leq 0$.

Supposons que $f(c) < 0$.

Comme f est continue en c , il existe un $\eta > 0$ tel que $f(x) < 0$ si $x \in]c - \eta, c + \eta[$.

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Puisque $f(b) > 0$, $b \notin]c - \eta, c + \eta[$, de plus $c \leq b$ donc $c + \eta \leq b$. Posons $x_0 = c + \frac{\eta}{2}$ alors $a \leq c < x_0 < c + \eta \leq b$, $f(x_0) < 0$, donc $x_0 \in G$, d'autre part $x_0 > c$, ce qui est impossible puisque c est la borne supérieure donc majorant de G , donc $f(c) = 0$.

Corollaire IV.2.2 (Théorème des valeurs intermédiaires). *Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I de \mathbb{R} . Soient a et b deux points de I tels que $a < b$. Alors, quel que soit le réel k strictement compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = k$.*

Démonstration - Supposons $f(a) \neq f(b)$ et soit k strictement compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (si $f(a) = f(b)$, k n'existe pas). On applique la proposition précédente à la fonction $g(x) = f(x) - k$. En effet,

$$g(a)g(b) = (f(a) - k)(f(b) - k)$$

est strictement négatif, puisque k est strictement compris entre $f(a)$ et $f(b)$. On peut ainsi appliquer le lemme précédent qui dit que

$$\exists c \in]a, b[: g(c) = 0, \quad \text{soit} \quad f(c) = k.$$

Théorème de la valeur intermédiaire

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.2.5 Fonctions continues sur un segment

Exercices :

[Exercice A.1.22](#)

Documents :

[Document C.1.2](#)

Proposition IV.2.4. *Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I de \mathbb{R} . Alors, l'image de I par f est un intervalle de \mathbb{R} .*

Démonstration - On utilise le fait qu'un sous ensemble J de \mathbb{R} est un intervalle si et seulement si :

$$\forall (y_1, y_2) \in J^2, [y_1, y_2] \subset J.$$

Posons $J = f(I)$ et soient y_1 et y_2 deux points distincts de J , alors il existe x_1 et x_2 dans I tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Comme $y_1 \neq y_2$ on a $x_1 \neq x_2$ (par définition de la notion de fonction). On peut alors appliquer le théorème des valeurs intermédiaires qui nous dit que pour tout y strictement compris entre y_1 et y_2 il existe un x strictement compris entre x_1 et x_2 donc appartenant à I tel que $f(x) = y$, ce qui signifie bien que $y \in J$, c'est-à-dire que $[y_1, y_2] \subset J$ et donc que J est un intervalle.

Théorème IV.2.4. *Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Soit f une fonction définie et continue sur $[a, b]$. Alors, l'ensemble $f([a, b])$ admet un plus grand élément et un plus petit élément, c'est-à-dire il existe x_1 et x_2 appartenant à $[a, b]$ tels que :*

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2).$$

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

La démonstration, assez technique, est donnée dans le document référencé.

Théorème IV.2.5. *Soit f une fonction définie et continue sur un segment $[a, b]$. Alors, l'image de $[a, b]$ par f est un segment $[\hat{a}, \hat{b}] : f([a, b]) = [\hat{a}, \hat{b}]$.*

Démonstration - D'après le théorème précédent, il existe $x_1, x_2 \in [a, b]$ tels que $f([a, b]) \subset [f(x_1), f(x_2)]$.

D'après la proposition (IV.2.4), l'image de l'intervalle $[a, b]$ par f est un intervalle $J : J = f([a, b])$.

$x_1 \in [a, b]$ donc $f(x_1) \in J$.

$x_2 \in [a, b]$ donc $f(x_2) \in J$.

J est un intervalle, donc $[f(x_1), f(x_2)] \subset J$.

Par double inclusion on obtient $J = [f(x_1), f(x_2)]$. Ce qui démontre que $f([a, b])$ est un intervalle fermé borné. En posant $\hat{a} = f(x_1)$, $\hat{b} = f(x_2)$, on obtient le résultat annoncé.

Fonctions continues sur un segment

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.2.6 Prolongement par continuité

Exercices :

[Exercice A.1.23](#)

Définition IV.2.2. - (*Prolongement par continuité*)

Soit $a \in \Omega$, soit f une fonction définie et continue sur $\Omega \setminus \{a\}$, on suppose que $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, alors on peut définir une fonction \tilde{f} sur Ω par :

$$\begin{cases} \forall x \in \Omega \setminus \{a\}, & \tilde{f}(x) = f(x), \\ \tilde{f}(a) = l. \end{cases}$$

La fonction \tilde{f} continue sur Ω est appelée **prolongement de f par continuité**.

Ainsi, par exemple, la fonction $\frac{\sin x}{x}$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et admet en 0 une limite :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

On peut donc la prolonger par continuité sur \mathbb{R} tout entier en définissant la fonction \tilde{f} par :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, & \tilde{f}(x) = \frac{\sin x}{x}, \\ \tilde{f}(0) = 1. \end{cases}$$

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Par contre, la fonction $f(x) = \sin(1/x)$, définie continue sur \mathbb{R}^* ne peut pas être prolongée par continuité en 0.

Prolongement par continuité

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

IV.2.7 Continuité uniforme

Cours :
[Continuité - définition](#)

Documents :
[Document C.1.3](#)

La fonction $f : x \rightarrow 1/x$ est continue sur $]0, 1]$ puisque l'on a pour tout $a > 0$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \left\{ |x - a| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| = \frac{|x - a|}{ax} < \varepsilon \right\}.$$

Il suffit en effet de prendre un η tel que

$$a - \eta > 0 \text{ et } \frac{\eta}{a(a - \eta)} < \varepsilon, \text{ soit } \eta < \min \left(\varepsilon \frac{a^2}{1 + a\varepsilon}, a \right).$$

On voit donc que, ε étant fixé, la valeur de η décroît avec la valeur de a . De façon un peu imagée on peut dire que, quand a tend vers 0, la fonction $f(x)$ est de 'moins en moins continue'. Il s'agit donc d'un exemple où pour ε donné le nombre η dépend de ε , ce qui est normal, et du point a en lequel on étudie la continuité. Ce qui suit a pour objet de formaliser le cas où précisément η ne dépend pas de a .

Définition IV.2.3. On dit qu'une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continue est **uniformément continue** sur Ω si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in \Omega^2, \{(|x - y| < \eta) \Rightarrow (|f(x) - f(y)| < \varepsilon)\}.$$

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Étudios à titre d'exemple, la fonction $f(x) = x^2$ sur l'intervalle $\Omega =]a, b[$. Nous avons $|x^2 - y^2| = |x - y||x + y|$ et pour $(x, y) \in]a, b]^2$ on a $|x + y| \leq |x| + |y| \leq M = 2 \max\{|a|, |b|\}$. Alors, pour $\varepsilon > 0$ donné, on prend $\eta = \varepsilon/M$ et on en déduit que pour $|x - y| \leq \eta$ on a :

$$|x^2 - y^2| \leq \eta|x + y| \leq \frac{\varepsilon}{M}M = \varepsilon$$

ce qui démontre bien la continuité uniforme.

Remarquons au passage que le raisonnement est possible car l'intervalle $]a, b[$ est borné. En particulier la fonction $f(x) = x^2$ n'est pas uniformément continue sur $]a, +\infty[$. Il est clair qu'une fonction uniformément continue est continue. Par contre, la réciproque est fautive en général. Le théorème suivant, que nous admettons, montre qu'elle est exacte pour des fonctions définies et continues sur un intervalle fermé borné de \mathbb{R} .

Théorème IV.2.6. (Théorème de Heine) Une fonction continue sur un intervalle fermé borné $[a, b]$ est uniformément continue.

Ce théorème, très important, est faux si l'intervalle sur lequel f est définie et continue n'est pas fermé ou n'est pas borné. Par exemple, nous venons de voir que la fonction $f(x) = 1/x$ est continue sur l'intervalle $]0, 1]$, mais elle n'est pas uniformément continue sur cet intervalle. De même, la fonction $f(x) = x^2$ n'est pas uniformément continue sur \mathbb{R} .

Continuité uniforme

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

IV.2.8 Fonctions strictement monotones

Exercices :

[Exercice A.1.24](#)

Proposition IV.2.5. *Soit f une fonction strictement croissante (resp. décroissante) définie sur un intervalle I de \mathbb{R} , soit $J = f(I)$. Alors f est bijective de I sur J . L'application réciproque f^{-1} est strictement croissante (resp. décroissante) sur J .*

Démonstration -

- (i) **f bijective.** L'application f est surjective de I sur J par définition de J , on peut montrer en exercice qu'elle est injective sur I , donc elle est bijective de I sur son image J , elle admet donc une application réciproque f^{-1} .
- (ii) **Monotonie de f^{-1} .** Plaçons-nous dans le cas où f est strictement croissante, le cas décroissante se traitant de manière analogue.

On doit montrer que

$$\forall y, y' \in J, \quad y > y' \Rightarrow f^{-1}(y) > f^{-1}(y'),$$

ce qui est équivalent à

$$\forall y, y' \in J, \quad f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y') \Rightarrow y \leq y'.$$

Or f est strictement croissante donc croissante on a donc bien

$$\forall y, y' \in J, \quad f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y') \Rightarrow f(f^{-1}(y)) \leq f(f^{-1}(y')) \Rightarrow y \leq y'.$$

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Proposition IV.2.6. *Soit f une fonction continue strictement croissante (resp. décroissante) définie sur un intervalle ouvert Ω de \mathbb{R} , soit $\Omega' = f(\Omega)$. Alors Ω' est un intervalle ouvert.*

Démonstration - On suppose que f est strictement croissante, le cas décroissante se traite de façon analogue. Puisque f est continue, Ω' est un intervalle, montrons que c'est un intervalle ouvert

$$y_0 \in \Omega' \Rightarrow \exists x_0 \in \Omega, \quad y_0 = f(x_0).$$

Ω est un intervalle ouvert, donc $\exists \alpha > 0, \quad]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[\subset \Omega$.

On note

$$y_1 = f\left(x_0 - \frac{\alpha}{2}\right), y_2 = f\left(x_0 + \frac{\alpha}{2}\right).$$

f est strictement croissante donc $y_1 < y_0 < y_2$.

$x_0 - \frac{\alpha}{2} \in \Omega$, donc $y_1 \in \Omega'$.

$x_0 + \frac{\alpha}{2} \in \Omega$, donc $y_2 \in \Omega'$.

Ω' est un intervalle donc $]y_1, y_2[\subset \Omega'$, donc $]y_1, y_2[\subset \Omega'$

On vient de démontrer que pour tout y_0 appartenant à Ω' , il existe un intervalle ouvert $]y_1, y_2[$ tel que $y_0 \in]y_1, y_2[$ et $]y_1, y_2[\subset \Omega'$, donc Ω' est un intervalle ouvert.

Proposition IV.2.7. *Soit f une fonction définie, continue et strictement croissante (resp. décroissante) sur un intervalle ouvert Ω de \mathbb{R} . Soit $\Omega' = f(\Omega)$. Alors, f admet une fonction réciproque g définie, continue et strictement croissante (resp. décroissante) de Ω' sur Ω .*

Démonstration - Plaçons-nous dans le cas où f est croissante, le cas f décroissante se traitant de manière analogue.

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Soit $y_0 \in \Omega'$ et x_0 l'unique élément de Ω tel que $y_0 = f(x_0) \Leftrightarrow x_0 = f^{-1}(y_0)$, il faut montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe η tel que :

$$\forall y \in \Omega', (y_0 - \eta \leq y \leq y_0 + \eta) \Rightarrow (f^{-1}(y_0) - \varepsilon \leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_0) + \varepsilon).$$

Or, si η est donné par

$$\eta = \min\{f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)\}$$

alors on a :

$$(y_0 - \eta \leq y \leq y_0 + \eta) \Rightarrow (f(x_0 - \varepsilon) \leq y \leq f(x_0 + \varepsilon)).$$

Et en appliquant f^{-1} aux trois membres de cette double inégalité, on a, grâce à la monotonie croissante de cette fonction :

$$x_0 - \varepsilon \leq f^{-1}(y) \leq x_0 + \varepsilon.$$

C'est le résultat désiré.

Fonctions strictement monotones

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Annexe A

Exercices

A.1	Exercices du chapitre IV	41
A.2	Exercices de TD	66

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

A.1 Exercices du chapitre IV

A.1.1	Ch4-Exercice1	42
A.1.2	Ch4-Exercice2	43
A.1.3	Ch4-Exercice3	44
A.1.4	Ch4-Exercice4	45
A.1.5	Ch4-Exercice5	46
A.1.6	Ch4-Exercice6	47
A.1.7	Ch4-Exercice7	48
A.1.8	Ch4-Exercice8	49
A.1.9	Ch4-Exercice9	50
A.1.10	Ch4-Exercice10	51
A.1.11	Ch4-Exercice11	52
A.1.12	Ch4-Exercice12	53
A.1.13	Ch4-Exercice13	54
A.1.14	Ch4-Exercice14	55
A.1.15	Ch4-Exercice15	56
A.1.16	Ch4-Exercice16	57
A.1.17	Ch4-Exercice17	58
A.1.18	Ch4-Exercice18	59
A.1.19	Ch4-Exercice19	60
A.1.20	Ch4-Exercice20	61
A.1.21	Ch4-Exercice21	62
A.1.22	Ch4-Exercice22	63

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

A.1.23	Ch4-Exercice23	64
A.1.24	Ch4-Exercice24	65

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents



Exercice A.1.1 Ch4-Exercice1

Montrer que l'intersection d'un nombre fini de voisinages de a est un voisinage de a .

[retour au cours](#)

Solution

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.2 Ch4-Exercice2

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{-1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$, montrer qu'elle admet une limite en $x = -1$.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.3 Ch4-Exercice3

Montrer, en utilisant la compatibilité de la multiplication avec la relation d'ordre \leq , que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+, (x \leq \varepsilon) \iff (x^2 \leq \varepsilon^2)$$

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.4 Ch4-Exercice4

Montrer que la fonction $x \rightarrow x^2$ admet pour limite 0 en $x = 0$.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.5 Ch4-Exercice5

On considère la fonction $x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$, définie sur \mathbb{R}^* . Montrer qu'elle admet en 0 une limite à droite égale à 1 et une limite à gauche égale à -1 , mais qu'elle n'admet pas de limite en 0.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.6 Ch4-Exercice6

Montrer que f admet une limite en a si et seulement si f admet une limite à gauche et une limite à droite en a qui sont égales.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.7 Ch4-Exercice7

Soit la fonction $x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$, définie sur \mathbb{R}^* . Trouver une suite (x_n) qui tend vers 0 et telle que $(f(x_n))$ ne tend pas vers 1. En déduire que $\lim_{x \rightarrow 0} x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ (si elle existe) est différente de 1.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.8 Ch4-Exercice8

En utilisant le théorème des gendarmes, montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.9 Ch4-Exercice9

1. On suppose que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ et que $|f(x)| \leq g(x)$ pour $x > A > 0$, montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
2. Soient trois fonctions f_1, f_2 et g telles que $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$ pour $x > A > 0$. Si f_1 et f_2 ont même limite l à l'infini, montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$.
3. En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3}{x+2} = 1$.

[retour au cours](#)

Solution

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.10 Ch4-Exercice10

On suppose que la fonction f est strictement négative (resp. positive) au voisinage d'un point a , quel est le signe de la limite de f au point a ? Donner un exemple de chacun des cas.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.11 Ch4-Exercice11

Sachant que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x$ en utilisant la composition des fonctions.

[retour au cours](#)

Solution

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.12 Ch4-Exercice12

Montrer que $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.13 Ch4-Exercice13

Soient deux fonctions f et g définies au voisinage de a et telles que $g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$. Montrer que si f est minorée, au voisinage de a , par un réel strictement positif, alors $f(x)g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.14 Ch4-Exercice14

Soit f telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ avec $l > 0$.

1. Montrer, en utilisant la définition de la limite qu'il existe $\eta > 0$ tel que si $0 < |x - a| < \eta$ alors $f(x) > \frac{l}{2}$.
2. On suppose que $g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$, montrer que $f(x)g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$.
3. Montrer que les résultats précédents sont encore valables quand x tend vers l'infini.
4. Appliquer ce résultat pour calculer la limite de $\frac{x+1}{2x-1}e^x$ quand $x \rightarrow +\infty$.

[retour au cours](#)

Solution

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.15 Ch4-Exercice15

Voici quelques exemples d'indéterminations que vous allez traiter.

$(\frac{0}{0})$ Soit $f(x) = x^\alpha$, $g(x) = x^\beta$, où α et β sont deux réels positifs. Donner $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ en fonction des valeurs de α et β .

$(\frac{\infty}{\infty})$ Inspirez-vous du cas $(\frac{0}{0})$ pour trouver un exemple.

$(\infty - \infty)$ Soit $f(x) = x$, $g(x) = x - h(x)$. Il est clair que le comportement de $(f - g)(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$ peut être très différent selon celui de la fonction h . Trouver une fonction h qui tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, telle que g tend aussi vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$(0 \times \infty)$ Comment peut-on se ramener à la forme $(\frac{0}{0})$?

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.16 Ch4-Exercice16

En utilisant le fait que $\sin x$ et $\cos x$ sont continues en 0, montrer que $\sin x$ est continue en tout point $a \in \mathbb{R}$.

[retour au cours](#)

Solution

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.17 Ch4-Exercice17

Écrire la définition de : f n'est pas continue au point a . Montrer alors que la fonction de Heaviside H définie par $H(x) = 0$ pour $x < 0$ et $H(x) = 1$ pour $x > 0$ n'est pas continue en 0 , quelle que soit la valeur qu'on lui attribue au point $x = 0$.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.18 Ch4-Exercice18

Démontrer en utilisant les suites que la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

n'est pas continue en 0.

[retour au cours](#)

Solution

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.19 Ch4-Exercice19

Connaissant la continuité des fonctions élémentaires montrer que, par exemple, les fonctions $\sin x^p$, e^{-x^2} , $\ln(x^2 + 1)$, ... sont des fonctions continues en tout point de \mathbb{R} . Construire des fonctions continues assez compliquées. . .

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.20 Ch4-Exercice20

Soit $p(x)$ un polynôme de degré impair à coefficients réels. En utilisant le fait que $p(x) \rightarrow \pm\infty$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, montrer qu'il existe a et b tels que $p(a) > 0$ et $p(b) < 0$. En déduire qu'un polynôme de degré impair a au moins une racine réelle.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.21 Ch4-Exercice21

On suppose que $a \leq b$, soit f une fonction définie et continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs dans ce segment. Montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = x$.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.22 Ch4-Exercice22

Quelle est l'image du segment $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ par $\sin x$, par $\cos x$?

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.23 Ch4-Exercice23

Peut-on prolonger par continuité la fonction $\frac{1 - \cos x}{x^2}$ en 0 ?

[retour au cours](#)

Solution

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.1.24 Ch4-Exercice24

Montrer que si f est une fonction strictement monotone définie sur un intervalle I , alors elle est injective.

[retour au cours](#)

[Solution](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

A.2 Exercices de TD

A.2.1	TD4-Exercice1	67
A.2.2	TD4-Exercice2	68
A.2.3	TD4-Exercice3	69
A.2.4	TD4-Exercice4	70
A.2.5	TD4-Exercice5	71
A.2.6	TD4-Exercice6	72
A.2.7	TD4-Exercice7	73
A.2.8	TD4-Exercice8	74
A.2.9	TD4-Exercice9	75

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Exercice A.2.1 TD4-Exercice1

Les fonctions suivantes admettent-elles une limite ? Si oui laquelle ?

$$f(x) = x + 2 - \sqrt{x^2 + 4x} \text{ quand } x \rightarrow +\infty, (\text{rép} : \text{oui}, 0),$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1} \text{ quand } x \rightarrow 0, (\text{rép} : \text{oui}, 0).$$

[Aide 1](#) [Aide 2](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.2 TD4-Exercice2

Étudier les limites suivantes :

1. $\frac{\sqrt[3]{x^2+1}}{x+1}$ quand $x \rightarrow +\infty$
2. $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}$ quand $x \rightarrow +\infty$
3. $\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$ quand $x \rightarrow 0$, (poser $a = \sqrt[6]{1+x}$.)
4. $\frac{x}{x^2 + \sin x}$ quand $x \rightarrow 0$.
5. $\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x}$ quand $x \rightarrow 0$.
6. $\frac{(1 - \cos x) \sin x}{x \tan^2 x}$ quand $x \rightarrow 0$.

Question 1 [Aide 1](#)

Question 2 [Aide 1](#)

Question 3 [Aide 1](#)

Question 4 [Aide 1](#)

Question 5 [Aide 1](#)

Question 6 [Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.3 TD4-Exercice3

Étudier la limite en 0 des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, $f(0) = 0$,

2. $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, $f(0) = 0$,

3. $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, $f(0) = 0$,

Question 1 [Aide 1](#)

Question 2 [Aide 1](#)

Question 3 [Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.4 TD4-Exercice4

Soit $f(x) = \frac{x}{1 - x + \frac{|x|}{x}}$, étudier la limite de f en tout point x_0 de \mathbb{R} .

[Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.5 TD4-Exercice5

1. Montrer que si f définie sur $D \subset \mathbb{R}$ admet une limite en x_0 , alors la fonction $|f|$ admet une limite en x_0 . Laquelle?
2. Montrer que la réciproque est fausse.

Question 1 [Aide 1](#)

Question 2 [Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.6 TD4-Exercice6

Soit f une fonction continue sur \mathbb{R} telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution réelle. En déduire que tout polynôme de degré impair admet au moins une racine réelle.

[Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.7 TD4-Exercice7

1. Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une application continue, montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution (au moins). Cette solution est-elle unique?
2. Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une application continue qui vérifie :

$$\forall x_1, x_2 \in [a, b], x_1 \neq x_2 \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < |x_1 - x_2|.$$

Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique.

3. Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une application continue et décroissante. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution.

Question 1 [Aide 1](#)

Question 2 [Aide 1](#)

Question 3 [Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.8 TD4-Exercice8

Soit f définie par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| = 1 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n+1} + 1}{x^{2n} - 1} & \text{si } |x| \neq 1 \end{cases}$ Étudier la continuité de f .

[Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exercice A.2.9 TD4-Exercice9

Soit la fonction définie par $f(x) = e^x$.

1. Montrer en utilisant la définition que la fonction f est continue en 0. Faire une figure. (On pourra montrer que $\eta = \ln(1 + \epsilon)$.)
2. Montrer en utilisant la définition que la fonction f est continue en tout point x_0 de \mathbb{R} . (On pourra montrer que $\eta = \ln(1 + \epsilon e^{-x_0})$.)
3. Montrer en utilisant la définition que la fonction f est uniformément continue sur $[0, 1]$. (On pourra montrer que $\eta = \ln(1 + \epsilon e^{-1})$.)
4. Montrer que

$$\forall \eta > 0, \exists x_0 > \ln \frac{1}{e^\eta - 1} \text{ et } \exists x = x_0 + \eta, |x - x_0| \leq \eta \text{ et } |e^x - e^{x_0}| > 1.$$

En déduire que f n'est pas uniformément continue sur \mathbb{R} .

- Question 1 [Aide 1](#)
- Question 2 [Aide 1](#)
- Question 3 [Aide 1](#)
- Question 4 [Aide 1](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Annexe B

Exemples

B.1 Exemples du chapitre IV 77

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

B.1 Exemples du chapitre IV

B.1.1	Application du théorème des gendarmes	78
B.1.2	Exemple de composition de limites	81
B.1.3	Exemple de continuité	82

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Exemple B.1.1 Application du théorème des gendarmes

Étudions la limite de :

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad \text{quand } x \rightarrow 0.$$

Nous allons montrer par des considérations géométriques élémentaires que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (0 < x < \frac{\pi}{2}) \Rightarrow (\sin x < x < \tan x).$$

Soit donc le cercle trigonométrique (voir la figure (B.1.1)). Il coupe le demi-axe des x positifs au point A . Soit B le point de ce cercle correspondant à l'angle θ . Notons H sa projection sur l'axe des x . Notons C l'intersection de la droite $x = 1$ avec la droite portant OB . Nous savons, que par définition, $OH = \cos \theta$, $HB = \sin \theta$, $AC = \tan \theta$.

1. Nous voyons sur la figure que :

$$|HB| < |AB| < |\text{arc } AB|, \quad \text{d'où } \sin \theta < \theta.$$


2. Nous voyons aussi sur la figure que l'aire du triangle curviligne OAB est inférieure à l'aire du triangle OAC , ce qui donne :

$$\pi \frac{\theta}{2\pi} < \frac{1}{2} \tan \theta, \quad \text{soit } \theta < \tan \theta.$$

Notons au passage, que le théorème de Thalès, nous permet de retrouver tout de suite que $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$.

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

FIG. B.1.1 – $\sin \theta < \theta < \tan \theta$

Notons aussi qu'une autre démonstration des deux inégalités ci-dessus consiste à étudier les variations des fonctions $x - \sin x$ et $\tan x - x$.

Nous en déduisons que :

$$\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[, \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Exemple B.1.1

Application du
théorème des
gendarmes

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Comme $\cos x \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0$, on obtient finalement en appliquant la proposition IV.1.4, et en remarquant que la fonction f est paire :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

[retour au cours](#)

Exemple B.1.1
Application du
théorème des
gendarmes

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exemple B.1.2 Exemple de composition de limites

On peut déduire la limite en 0 de $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ du résultat démontré dans l'exemple B.1.1. Pour cela on écrit $\cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, ce qui permet d'écrire f sous la forme

$$f(x) = \frac{1 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{4}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2.$$

En considérant la fonction $x \mapsto \frac{x}{2}$ et en utilisant le résultat sur la composition des limites, on obtient

$$\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \rightarrow 1 \text{ quand } x \rightarrow 0.$$

Le produit des limites donne donc

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \text{ quand } x \rightarrow 0.$$

[retour au cours](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Exemple B.1.3 Exemple de continuité

Soient $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a \neq 0$. Montrons que f est continue en a . On a

$$|f(a+h) - f(a)| = \left| \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|h|}{|a(a+h)|}.$$

1. Supposons a strictement positif. Alors il existe un réel α tel que $0 < \alpha < a$ et :

$$(-\alpha < h < \alpha) \Rightarrow (a+h > a-\alpha > 0).$$

Posons $M = a(a-\alpha)$ et soit $\varepsilon > 0$ donné, alors en prenant $\eta = \min\{\alpha, M\varepsilon\}$ on déduit que :

$$(|h| < \eta) \Rightarrow (|f(a+h) - f(a)| = \frac{|h|}{M} < \frac{\eta}{M})$$

et donc $|f(a+h) - f(a)| < \varepsilon$.

2. Même raisonnement pour $a < 0$.

[retour au cours](#)

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Annexe C

Documents

C.1 Documents du chapitre IV 84

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

C.1 Documents du chapitre IV

C.1.1	Caractérisation de la limite par les suites - condition suffisante	85
C.1.2	Image d'un segment par une fonction continue	87
C.1.3	Démonstration du théorème de Heine	89

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Document C.1.1 Caractérisation de la limite par les suites - condition suffisante

Théorème C.1.1. *Soient $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction numérique définie sur un voisinage de a . Alors, une condition nécessaire et suffisante pour que $f(x)$ tende vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque x tend vers a est que, quelle que soit la suite (x_n) convergeant vers a , $x_n \neq a$, la suite $(f(x_n))$ converge vers l .*

Démonstration - La démonstration de la condition nécessaire est dans le cours. Montrons que la condition est suffisante. La démonstration est a priori plus difficile dans ce sens que dans l'autre, parce que cette fois ci, il faut passer d'une convergence discrète à une convergence continue. C'est pourquoi, nous allons passer par la contraposée. Plus précisément, au lieu de montrer que

$$\{\forall(x_n), \{(x_n) \rightarrow a\} \Rightarrow \{(f(x_n)) \rightarrow l\}\} \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l,$$

nous allons montrer la contraposée

$$\mathbf{non} \left\{ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \right\} \implies \mathbf{non} \left\{ \forall(x_n), \{(x_n) \rightarrow a\} \Rightarrow \{(f(x_n)) \rightarrow l\} \right\}.$$

L'intérêt de ce choix, c'est de permettre de passer de $x \rightarrow a$ à $x_n \rightarrow a$.

Écrivons donc $\mathbf{non} \left\{ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \right\}$. La négation s'explique en

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in \mathbb{R}, \quad (0 < |x - a| < \eta) \mathbf{et} (|f(x) - l| \geq \varepsilon). \quad (\text{C.1.1})$$

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Nous voulons montrer que cela implique

$$\mathbf{non} \{ \forall (x_n), \{(x_n) \rightarrow a\} \Rightarrow \{(f(x_n)) \rightarrow l\} \},$$

ce qui s'explique en

$$\exists (x_n), \{(x_n) \rightarrow a\} \mathbf{et non} \{(f(x_n)) \rightarrow l\}. \quad (\text{C.1.2})$$

Pour ce faire, il nous suffit d'exhiber une suite pour laquelle (C.1.2) est vraie. Nous allons la construire, en particulierisant le η de (C.1.1). Plus précisément nous allons écrire (C.1.1) pour une suite de valeurs de η tendant vers 0, par exemple pour la suite $\eta_n = 1/n$. Nous obtenons ainsi

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta_n > 0, \exists x_n \in \mathbb{R}, \quad (0 < |x_n - a| < \eta_n) \mathbf{et} (|f(x_n) - l| \geq \varepsilon).$$

ou encore de manière équivalente

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}_*, \exists x_n \in \mathbb{R}, \quad (0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}) \mathbf{et} (|f(x_n) - l| \geq \varepsilon).$$

ce qui interdit à la suite $(f(x_n))$ ainsi construite de converger vers l , bien que la suite (x_n) correspondante converge vers a .

Nous avons donc bien montré la contraposée et donc que la condition est suffisante.

[retour au cours](#)

Document

C.1.1

Caractérisation
de la limite par
les suites -
condition
suffisante

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Document C.1.2 Image d'un segment par une fonction continue

Théorème C.1.2. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Soit f une fonction définie et continue sur $[a, b]$. Alors f est bornée et atteint ses bornes, c'est-à-dire il existe x_1 et x_2 dans $[a, b]$ tels que

$$\forall x \in [a, b], f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2).$$

Démonstration - 1/ Soit $r \in \mathbb{R}$ tel que

$$A_r = \{x \in [a, b] \mid f(x) \geq r\}$$

ne soit pas vide. Il existe de telles valeurs de r , par exemple $r = f(a)$. Comme A_r est une partie de $[a, b]$, A_r est majoré. Il admet donc une borne supérieure $s_r = \sup A_r$. Mais alors

$$\forall n \geq 1, \exists x_n \in A_r \subset [a, b] : s_r - \frac{1}{n} < x_n \leq s_r,$$

de sorte que cette suite (x_n) converge vers s_r . Mais comme tous les x_n appartiennent à l'intervalle $[a, b]$, on a à la limite $a \leq s_r \leq b$. Comme d'autre part les x_n appartiennent à A_r on a $f(x_n) \geq r$, d'où à la limite $f(s_r) \geq r$, ce qui montre que s_r appartient à A_r .

Supposons maintenant que f ne soit pas majorée, soit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x \in [a, b] : f(x) \geq n.$$

Mais alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, A_n = \{x \in [a, b] \mid f(x) \geq n\}$$

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

est non vide. Comme

$$(f(x) \geq n + 1) \Rightarrow (f(x) \geq n)$$

on a $A_{n+1} \subset A_n$. Ainsi s_n majore A_{n+1} , d'où $s_{n+1} \leq s_n$, de sorte que la suite s_n est décroissante et minorée par a : elle est donc convergente. Soit l sa limite.

Comme s_n appartient à $[a, b]$ où f est continue, $f(s_n)$ converge vers $f(l)$. Comme d'autre part par définition des A_n , on a $f(s_n) \geq n$, on aboutit à une contradiction. Nous avons ainsi montré que f est majorée. On montre qu'elle est minorée en appliquant le résultat précédent à $-f$.

2/ Soient donc m et M les bornes inférieure et supérieure de l'ensemble $\{f(x), x \in [a, b]\}$ (on les appelle simplement bornes inférieure et supérieure de f sur $[a, b]$). Il ne reste plus qu'à montrer que m et M sont atteintes.

Supposons que ce ne soit pas le cas. On aurait alors, pour tout x de $[a, b]$, $f(x) < M$. Soit alors g la fonction

$$g : [a, b] \mapsto \mathbb{R} : g(x) = \frac{1}{M - f(x)}.$$

Cette fonction est bien définie sur $[a, b]$ et continue. Elle est donc majorée. Soit K un majorant de g et soit $(y_n = f(x_n))$ une suite de $f([a, b])$ convergeant vers M . Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M$$

de sorte que la suite $(g(x_n))$ ne peut pas être bornée, ce qui contredit $g(x) \leq K$.

[retour au cours](#)

Document

C.1.2

Image d'un segment par une fonction continue

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Document C.1.3 Démonstration du théorème de Heine

Le but de ce document est de démontrer le :

Théorème C.1.3. (*Théorème de Heine*) Une fonction numérique définie et continue sur un intervalle fermé borné de \mathbb{R} y est uniformément continue.

Pour démontrer ce théorème nous aurons recours au lemme ci-dessous qui est d'ailleurs intéressant en lui-même :

Lemme C.1.1. De toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente.

Démonstration du lemme - Soit donc (u_n) une suite bornée. Le sous-ensemble de \mathbb{R} constitué des éléments de cette suite étant borné, admet une borne supérieure L . Cette borne supérieure étant le plus petit des majorants, nous avons :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \quad L - \varepsilon < u_N \leq L. \quad (\text{C.1.3})$$

Nous allons construire une sous-suite de (u_n) à partir de cette propriété. Choisissons pour tout $q = 0, 1, \dots$ $\varepsilon_q = 1/q$. Alors (C.1.3) se réécrit :

$$\forall q \in \mathbb{N}, \exists N_q \in \mathbb{N}, \quad L - \frac{1}{q} < u_{N_q} \leq L.$$

Ainsi, la suite $(u_{N_q})_{q \in \mathbb{N}}$, est effectivement extraite de la suite (u_n) et converge vers L .

Démonstration du théorème -

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Soit donc f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a, b]$ fermé borné de \mathbb{R} et à valeurs dans \mathbb{R} . Supposons que cette fonction ne soit pas uniformément continue. Alors la négation de :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists \eta \in \mathbb{R}, \forall x \in [a, b], \forall y \in [a, b], \\ (|x - y| \leq \eta) \Rightarrow (|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon) \end{array} \right.$$

s'écrit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists \varepsilon > 0, \forall \eta \in \mathbb{R}, \exists x \in [a, b], \exists y \in [a, b], \\ (|x - y| \leq \eta) \text{ et } (|f(x) - f(y)| > \varepsilon) \end{array} \right.$$

Prenons maintenant, pour $q = 1, 2, \dots$, $\eta_q = 1/q$. Il vient :

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists \varepsilon > 0, \forall \eta_q \in \mathbb{R}, \exists x_q \in [a, b], \exists y_q \in [a, b], \\ (|x_q - y_q| \leq \eta_q) \text{ et } (|f(x_q) - f(y_q)| > \varepsilon) \end{array} \right. \quad (\text{C.1.4})$$

Or, les suites (x_q) et (y_q) ainsi construites sont des suites d'éléments de $[a, b]$. Elles sont donc bornées. D'après le lemme précédent, nous pouvons extraire de chacune d'elles un sous-suite convergente. Soient c et d les limites respectives de ces sous suites extraites. Comme l'intervalle $[a, b]$ est fermé, c et d apprtiennent à cet intervalle. En notant (x'_q) et (y'_q) les sous-suites extraites, nous avons :

$$\lim_{q \rightarrow +\infty} x'_q = c, \quad \lim_{q \rightarrow +\infty} y'_q = d.$$

Mais alors du fait de la continuité de f en c et d , nous avons :

$$\lim_{q \rightarrow +\infty} f(x'_q) = f(c), \quad \lim_{q \rightarrow +\infty} f(y'_q) = f(d).$$

Document

C.1.3

Démonstration
du théorème de
Heine

Sommaire
Concepts

Exemples
Exercices
Documents

Maintenant, nous voyons que (C.1.4) implique contradictoirement que

$$c = d \quad \text{et} \quad f(c) \neq f(d),$$

ce qui est impossible.

[retour au cours](#)

Document

C.1.3

Démonstration
du théorème de
Heine

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Index des concepts

Le gras indique un grain où le concept est défini ; l'italique indique un renvoi à un exercice ou un exemple, le gras italique à un document, et le romain à un grain où le concept est mentionné.

C

Continuité et limite	24, 26
Continuité - définition	22, 34
Continuité uniforme	34

F

Fonctions continues - image d'un segment	30
Fonctions continues - opérations	26
Fonctions strictement monotones	36

L

Limite - comparaison des fonctions	12
Limite - lien avec les suites	9
Limite - définition	5
Limites - opérations	15
Limites à droite, à l'infini	7
Limites généralisées - définition	17
Limites généralisées - opérations	18

P

Prolongement	32
--------------------	-----------

V

Valeur intermédiaire - théorème	28
Voisinage d'un réel	4

[Sommaire](#)
[Concepts](#)

[Exemples](#)
[Exercices](#)
[Documents](#)

Solution de l'exercice A.1.1

Soient $(\mathcal{V}_{k=1,\dots,p})$ p voisinages de a . Alors, par définition, il existe $\alpha_k > 0$ tel que $]a - \alpha_k, a + \alpha_k[\subset \mathcal{V}_k$. L'intersection des p voisinages contient l'intersection des p intervalles $]a - \alpha_k, a + \alpha_k[$ qui est aussi un intervalle ouvert $]a - \alpha, a + \alpha[$ où

$$\alpha = \min_{k=1,\dots,p} \{\alpha_k\}.$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.2

Celle limite est $l = -2$, puisque

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta = \varepsilon, (0 < |x + 1| < \eta) \Rightarrow (|f(x) + 2| < \varepsilon)$$

En effet, x étant différent de -1 , on peut simplifier f et obtenir $f(x) = (x - 1)$, donc $|f(x) + 2| = |x + 1|$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.3

La relation de compatibilité de la multiplication avec la relation d'ordre s'écrit :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}^+, (a \leq b) \implies (ac \leq bc) \quad (\text{C.1.5})$$

1. Soient donc x et ε , deux éléments de \mathbb{R}^+ , tels que $x \leq \varepsilon$, alors :

$$0 \times x \leq x \times x \leq x \times \varepsilon \leq \varepsilon \times \varepsilon, .$$

soit effectivement $0 \leq x^2 \leq \varepsilon^2$, ce qui montre que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+, (x \leq \varepsilon) \implies (x^2 \leq \varepsilon^2) \quad (\text{C.1.6})$$

2. Soit maintenant x et ε deux éléments de \mathbb{R}^+ tels que $x^2 \leq \varepsilon^2$.

Par passage à la contraposée, (C.1.6) s'écrit aussi :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+, (x^2 > \varepsilon^2) \implies (x > \varepsilon)$$

Mais comme x et ε jouent le même rôle, nous avons aussi, de manière équivalente :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+, (x^2 < \varepsilon^2) \implies (x < \varepsilon)$$

D'autre part :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+, (x^2 = \varepsilon^2) \iff \{(x - \varepsilon)(x + \varepsilon) = 0\} \iff (x = \varepsilon)$$

de sorte que nous arrivons à :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+, (x^2 \leq \varepsilon^2) \implies (x \leq \varepsilon)$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.4

En effet, on a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta = \sqrt{\varepsilon}, (0 < |x| < \eta) \Rightarrow (|x^2| < \varepsilon),$$

puisque $x^2 < \eta^2 (= \varepsilon)$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.5

Pour $x > 0$, on a $x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \sqrt{1 + x^2}$ qui tend vers 1 quand x tend vers 0 puisque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta, (0 < x < \eta) \Rightarrow (\sqrt{1 + x^2} - 1 < \varepsilon),$$

on peut choisir $\eta = \sqrt{(1 + \varepsilon)^2 - 1}$. En effet, puisque $x > 0$, on a (voir l'exercice A.1.3 :

$$(\sqrt{1 + x^2} - 1 < \varepsilon) \Leftrightarrow (x^2 < (1 + \varepsilon)^2 - 1) \Leftrightarrow (x < \sqrt{(1 + \varepsilon)^2 - 1}).$$

Faire le même raisonnement pour $x < 0$ avec la différence que $x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -\sqrt{1 + x^2}$ qui tend vers -1 quand x tend vers 0.

f n'admet pas de limite en 0 puisque la limite à droite est différente de la limite à gauche.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.6

1. Si f admet une limite l en a , alors l est limite à gauche et limite à droite en a .
2. Réciproquement, écrivons que $f(a + 0) = f(a - 0) = l$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_1, (a < x < a + \eta_1) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon)$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_2, (a - \eta_2 < x < a) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon).$$

Il suffit alors de prendre $\eta = \min\{\eta_1, \eta_2\}$ pour montrer que f admet une limite en a égale à l .

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.7

Soit la suite $x_n = -\frac{1}{n}$, alors cette suite tend vers 0 et la suite $f(x_n) = -\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}$ tend vers -1 . D'où la limite en 0 ne peut être égale à 1 puisque l'on a exhibé une suite (x_n) qui tend vers 0 alors que la suite $(f(x_n))$ ne tend pas vers 1.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.8




FIG. C.1.1 – longueur d'arc et sinus

Si l'on regarde (voir la figure (C.1.1)). sur un graphique la longueur d'arc de cercle (de rayon 1) correspondant à un angle au centre θ (exprimé en radian), on a, pour $\theta \in [0, \pi/2]$: $0 \leq \sin \theta \leq \theta$. Si l'on fait tendre θ vers $0+$, alors $\sin \theta$ tend vers 0. Si maintenant on prend $\theta \in [-\pi/2, 0]$, alors on a $\theta \leq \sin \theta \leq 0$ et si l'on fait tendre

θ vers 0^- , alors $\sin \theta$ tend vers 0. La fonction $\sin \theta$ ayant une limite à droite égale à la limite à gauche en 0, sa limite en 0 est égale à 0.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.9

1. Écrivons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, (x > B) \Rightarrow (g(x) < \varepsilon).$$

Or pour $x > A > 0$, on a $|f(x)| \leq g(x)$, donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists C = \max\{A, B\} > 0, (x > C) \Rightarrow (|f(x)| < \varepsilon).$$

2. De même que pour la première question on refait les démonstrations du théorème de comparaison [IV.1.4](#) en remplaçant $\exists \eta$ par $\exists B > 0$ et $0 < |x - a| < \eta$ par $x > B$.

3. Pour $x > 0$, on a $0 < \frac{x+3}{x+2} - 1 = \frac{1}{x+2} \leq \frac{1}{x}$, et puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3}{x+2} - 1\right) = 0$ soit $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3}{x+2} = 1$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.10

Puisque $f(x) < 0$ (resp. $f(x) > 0$) au voisinage de a , en appliquant le résultat sur la comparaison des limites, on obtient $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq 0$ (resp. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq 0$).

Par exemple $\sqrt{|x|} > 0$ (resp. $-\sqrt{|x|} < 0$) pour tout x , donc évidemment dans un voisinage de 0, et $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} = 0$ (resp. $\lim_{x \rightarrow 0} -\sqrt{|x|} = 0$).

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.11

Pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, on a $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$. Puisque $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} 1 - y^2 = 1$ et que $\lim_{z \rightarrow 1} \sqrt{z} = 1$ en composant toutes ces fonctions et en appliquant le théorème sur la composition des limites, on obtient que $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 - \sin^2 x} = 1$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.12

Remarquons que, si $A > 0$, $(\sqrt{x} > A) \Leftrightarrow (x > A^2)$. On a donc

$$\forall A > 0, \exists B = A^2 (> 0), (x > B) \Rightarrow (\sqrt{x} > A).$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.13

f est minorée par un réel strictement positif au voisinage de a , donc

$$\exists m > 0, \exists \alpha > 0, \{x \in]a - \alpha, a + \alpha[\Rightarrow f(x) > m > 0\}.$$

D'autre part $g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$, donc :

$$\forall B > 0, \exists \beta > 0, (0 < |x - a| < \beta) \Rightarrow (g(x) > B),$$

pour $A > 0$ donné, on prend $B = A/m$, $\eta = \min\{\alpha, \beta\}$ et on obtient que :

$$(0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow (f(x)g(x) > Bm(= A)),$$

ce qui montre que $f(x)g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow a$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.14

1. Écrivons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, (0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon).$$

Puisque $l > 0$, on peut choisir $\varepsilon = \frac{l}{2}$, on a donc l'existence de η tel que :

$$(0 < |x - a| < \eta) \Rightarrow \left(\frac{l}{2} < f(x) < \frac{3l}{2}\right),$$

ce qui prouve le résultat.

2. On applique l'exercice [A.1.13](#) puisque l'on vient de montrer que f est minorée par $\frac{l}{2} > 0$ dans un voisinage de a .
3. Les résultats précédents se démontrent même si a est infini. En effet on remplace $0 < |x - a| < \eta$ par $x > C > 0$.
4. On a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+1/x}{2-1/x} = \frac{1}{2} (> 0)$$

et $e^x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, d'où $\frac{x+1}{2x-1}e^x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.15

1. On a $\frac{f(x)}{g(x)} = x^{\alpha-\beta}$, soit :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > \beta \\ 1 & \text{si } \alpha = \beta \\ +\infty & \text{si } \alpha < \beta \end{cases}$$

2. On prend $f(x) = \frac{1}{x^\beta}$, $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$, on fait tendre x vers 0 par valeurs supérieures, on a les mêmes résultats.
3. Il suffit de prendre $h(x) = \frac{x}{2}$. Par contre si l'on prend $h(x) = 1$, on ne trouve absolument pas le même résultat pour $f - g$.
4. En écrivant $f.g = \frac{f}{1/g}$, on voit que cette forme indéterminée peut-être ramenée à la forme $(\frac{0}{0})$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.16

On écrit que $\sin x = \sin((x - a) + a)$ et on utilise les relations trigonométriques

$$\sin((x - a) + a) - \sin a = \sin(x - a) \cos a + \cos(x - a) \sin a - \sin a = \sin a(\cos(x - a) - 1) + \sin(x - a) \cos a$$

et donc

$$|\sin(x - a + a) - \sin a| \leq |\sin a| |\cos(x - a) - 1| + |\cos a| |\sin(x - a)|$$

On utilise alors le fait que $\lim_{y \rightarrow 0} \sin y = 0$ et $\lim_{y \rightarrow 0} \cos y = 1$ et on considère $\varepsilon > 0$. Alors

$$\exists \eta_1 > 0, (|y| < \eta_1) \Rightarrow (|\sin y| < \varepsilon / |\cos a|)$$

$$\exists \eta_2 > 0, (|y| < \eta_2) \Rightarrow (|\cos y - 1| < \varepsilon / |\sin a|)$$

Si on pose $y = x - a$ et si on prend $\eta = \min\{\eta_1, \eta_2\}$, on obtient

$$|x - a| < \eta \Rightarrow |\sin x - \sin a| < 2\varepsilon$$

ce qui montre la continuité de $\sin x$ au point a .

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.17

H n'est pas continue au point a s'écrit :

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \eta > 0, \exists x \text{ tel que } (|x - a| < \eta) \text{ et } (|H(x) - H(a)| \geq \varepsilon)$$

On prend $\varepsilon = \frac{1}{2}$, on choisit $\eta > 0$ quelconque.

1. Si $H(0) \geq \frac{1}{2}$, posons $x = -\frac{\eta}{2}$, alors

$$(|x| < \eta) \text{ et } (|H(x) - H(0)| = H(0) \geq \varepsilon)$$

2. Si $H(0) \leq \frac{1}{2}$, posons $x = \frac{\eta}{2}$, alors

$$(|x| < \eta) \text{ et } (|H(x) - H(0)| = 1 - H(0) \geq \varepsilon)$$

◌

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.18

On peut prendre par exemple $x_n = \frac{1}{n}$. Alors $f(x_n) = 1$ et cette suite ne tend pas vers $f(0) = 0$!

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.19

Ce sont toutes des composées de fonctions continues ...

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.20

Supposons que le coefficient du plus haut degré est positif. Puisque $p(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, cela donne :

$$\forall A > 0, \exists B > 0, (x > B) \Rightarrow (p(x) > A).$$

Il existe donc au moins $b \in \mathbb{R}$ tel que $p(b) > 0$. On fait le même raisonnement en $-\infty$ et on obtient $a \in \mathbb{R}$ tel que $p(a) < 0$. Puisqu'un polynôme est une fonction continue et que $p(a)p(b) < 0$ alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $p(c) = 0$.

Refaire le raisonnement lorsque le coefficient du plus haut degré est négatif.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.21

Soit $g(x) = f(x) - x$, alors $g(a) = f(a) - a$ et puisque $f(x) \in [a, b]$, alors $g(a) \geq 0$, on montre de même que $g(b) \leq 0$. Si g s'annule en a ou b , alors un point fixe de f est a ou b . Si g ne s'annule ni en a ni en b , alors $g(a)g(b) < 0$ et $\exists c \in]a, b[$ tel que $g(c) = 0$ et c est un point fixe de f .

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.22

L'image par $\sin x$ de $[-\pi/2, +\pi/2]$ est $[-1, 1]$ et par $\cos x$ c'est $[0, 1]$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.23

Puisque l'on a montré dans l'exemple [B.1.2](#) que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$, on peut donc prolonger cette fonction par continuité.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Solution de l'exercice A.1.24

Soit $x \neq y$, alors soit $x < y$ et $f(x) < f(y)$ (f est strictement croissante), soit $x > y$ et $f(x) > f(y)$. Dans tous les cas on obtient $f(x) \neq f(y)$, ce qui est la définition d'une fonction injective.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Exercice A.2.1

Multiplier et diviser par $x + 2 + \sqrt{x^2 + 4x}$ pour obtenir

$$f(x) = \frac{4}{x + 2 + \sqrt{x^2 + 4x}}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 2, Exercice A.2.1

Multiplier et diviser par $\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1}$ pour obtenir

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1}}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 1, Exercice A.2.2

Rappel : par définition $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$. Factoriser les plus grandes puissances de x au numérateur et dénominateur pour obtenir

$$\frac{\sqrt[3]{x^2 + 1}}{x + 1} = x^{-\frac{1}{3}} \frac{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{1}{3}}}{1 + \frac{1}{x}}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 2, Exercice A.2.2

Rappel : par définition $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. Factoriser les plus grandes puissances de x au numérateur et dénominateur pour obtenir

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x^2}}}}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 3, Exercice A.2.2

Avec $a = 1 + x^{\frac{1}{6}}$, on obtient $\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1} = \frac{a^3-1}{a^2-1}$. Utiliser l'identité remarquable $x^n - 1 = (x-1)(x^{n-1} + \dots + x + 1)$ pour obtenir l'égalité

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1} = \frac{a^2+a+1}{a+1}$$

valable uniquement pour $a \neq 1$ (à cause de la division par $a-1$) c'est-à-dire pour $x \neq 0$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 4, Exercice A.2.2

On se ramène à des limites connues, ici $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Pour $x \neq 0$, on a

$$\frac{x}{x^2 + \sin x} = \frac{1}{x + \frac{\sin x}{x}}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 5, Exercice A.2.2

On ne garde que des sin et des cos et on se ramène à des limites connues, ici $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$. Pour $x \neq 0$, on a

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{x \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \right)}{\frac{\sin x}{x}}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 6, Exercice A.2.2

On ne garde que des sin et des cos et on se ramène à des limites connues, ici $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$. Pour $x \neq 0$, on a

$$\frac{(1 - \cos x) \sin x}{x \tan^2 x} = \frac{(1 - \cos x) \cos^2 x}{x \sin x} = \frac{\frac{1 - \cos x}{x^2} \cos^2 x}{\frac{\sin x}{x}}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 1, Exercice A.2.3

Le sin est continu, reste borné, mais son argument (ici $\frac{1}{x}$) varie trop rapidement au voisinage de 0. On se doute que $f(x)$ n'a pas de limite en 0. Pour le montrer, il suffit de trouver une suite x_n qui tende vers 0 et telle que $f(x_n)$ n'ait pas de limite. Par exemple, $x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + n\pi}$. On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ et $f(x_n) = \sin(\frac{\pi}{2} + n\pi) = (-1)^n$ n'a évidemment pas de limite quand $n \rightarrow +\infty$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 2, Exercice A.2.3

Une majoration directe donne $|f(x)| \leq |x|$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 3, Exercice A.2.3

Une majoration directe donne $|f(x)| \leq x^2$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Exercice A.2.4

Il faut obtenir une expression plus simple de $f(x)$. Ici, on élimine les valeurs absolues. On rappelle que $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x \leq 0$. On obtient donc

$$\forall x > 0, \quad f(x) = \frac{x}{1 - x + \frac{x}{x}} = \frac{x}{2 - x}$$

$$\forall x < 0, \quad f(x) = \frac{x}{1 - x - \frac{x}{x}} = -1$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 1, Exercice A.2.5

Une démonstration directe à partir de la définition de limite utiliserait $||a| - |b|| \leq |a - b|$, valable pour tout réels a et b . Autre idée, remarquer que $|f|$ est la composée de f et de $x \mapsto |x|$ qui est continue. Le résultat découle alors d'un théorème vu en cours.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 2, Exercice A.2.5

Un contre-exemple suffit. Par exemple, $f(x) = 1$ si $x > 0$ et $f(x) = -1$ si $x \leq 0$. f n'a pas de limite en 0, bien que $|f(x)| = 1$ pour tout x .

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Exercice A.2.6

Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires [IV.2.2](#), la continuité de f le permet.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 1, Exercice A.2.7

Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à $g(x) = f(x) - x$: voir l'exercice [A.1.21](#). L'unicité n'est pas garantie, il est facile de tracer le graphe d'un exemple de fonction f pour laquelle l'équation $f(x) = x$ admet plusieurs solutions.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 2, Exercice A.2.7

Pour obtenir l'unicité raisonner par l'absurde, ou par contraposée.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 3, Exercice A.2.7

f décroissante signifie $x_1 \leq x_2 \implies f(x_2) \leq f(x_1)$.

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Exercice A.2.8

Il faut obtenir une expression plus simple de f , ce qui revient ici à calculer, pour chaque x fixé, la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n+1}+1}{x^{2n}-1}$. Et pour cela, il suffit de distinguer les cas $|x| < 1$ (pour lequel x^n tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$) et $|x| > 1$ (pour lequel $|x|^n$ diverge vers $+\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$, pour x^n on discute selon le signe de x et la parité de n). On obtient finalement

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 1 \text{ ou } x = -1 \\ -1 & \text{si } -1 < x < 1 \\ x & \text{si } x < -1 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 1, Exercice A.2.9

Revoir le cours, et en particulier la définition de limite et celle de continuité. Comprendre pourquoi le η dépend de ϵ .

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 2, Exercice A.2.9

Revoir le cours, et en particulier la définition de limite et celle de continuité. Comprendre pourquoi le η dépend de ϵ et du point x_0 .

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 3, Exercice A.2.9

C'est le fait que $0 \leq x_0 \leq 1$ qui permet de choisir le même η pour tous ces x_0 .

[Retour à l'exercice ▲](#)

Aide 1, Question 4, Exercice A.2.9

Comprendre que plus x_0 grandit, plus on doit choisir (à ϵ donné) un η plus petit pour réaliser l'inégalité de la définition. La borne inférieure (dire pourquoi elle existe) de tous ces η quand x_0 varie dans \mathbb{R} est 0 (il faudrait qu'elle soit > 0 pour conclure à l'uniforme continuité sur \mathbb{R}).

[Retour à l'exercice ▲](#)