

Chapitre 4. Exercice A.2.6 Soient $a > 0$ et $b > 0$.

1. On utilise la caractérisation de la fonction partie entière :

$$\forall X \in \mathbb{R}, X - 1 < E(X) \leq X.$$

Pour $x \neq 0$ et $X = \frac{b}{x}$, on obtient $\frac{b}{x} - 1 < E\left(\frac{b}{x}\right) \leq \frac{b}{x}$.

$$x > 0 \Rightarrow \frac{x}{a} \times \left(\frac{b}{x} - 1\right) < \frac{x}{a} \times E\left(\frac{b}{x}\right) \leq \frac{x}{a} \times \frac{b}{x} \Rightarrow \frac{b}{a} - \frac{x}{a} < f_1(x) \leq \frac{b}{a}$$

$$x < 0 \Rightarrow \frac{x}{a} \times \left(\frac{b}{x} - 1\right) > \frac{x}{a} \times E\left(\frac{b}{x}\right) \geq \frac{x}{a} \times \frac{b}{x} \Rightarrow \frac{b}{a} - \frac{x}{a} > f_1(x) \geq \frac{b}{a}$$

Puisque $\frac{b}{a} - \frac{x}{a} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{b}{a}$, on en déduit grâce au théorème des gendarmes que $f_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{b}{a}$.

2. Il faut étudier la fonction f_2 sur les intervalles $] -a, 0[$ et $]0, a[$.

- Si $x \in]0, a[$, alors $\frac{x}{a} \in]0, 1[$ et $E(\frac{x}{a}) = 0$. Par conséquent $\forall x \in]0, a[$, $f_2(x) = 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = 0.$$

- Si $x \in] -a, 0[$, alors $\frac{x}{a} \in] -1, 0[$ et $E(\frac{x}{a}) = -1$. Par conséquent

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{b}{x} = +\infty.$$

conclusion : la limite à droite existe mais la limite à gauche n'existe pas donc la fonction f_2 n'admet pas de limite en 0.

Chapitre 4. Exercice A.2.4 À finir !

Exercice supplémentaire. Démontrer, à l'aide de la définition avec quantificateurs, que la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } 0 < x < 1 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

admet une limite finie quand $x \rightarrow 1$.

1. Représenter graphiquement cette fonction. On rappelle la définition de la limite.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]0, +\infty[, (|x - 1| < \eta \Rightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon).$$

2. Soit $\varepsilon > 0$ fixé. On doit commencer par résoudre l'inégalité $|f(x) - 1| < \varepsilon$.

Ici on doit le faire deux fois :

• À gauche de $a = 1$:

$$\left| \frac{1}{x} - 1 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \varepsilon < \frac{1}{x} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{1-\varepsilon} > x > \frac{1}{1+\varepsilon} & \text{si } 0 < \varepsilon < 1 \\ x > \frac{1}{1+\varepsilon} & \text{si } \varepsilon \geq 1. \end{cases}$$

L'application de la fonction inverse change le sens des symboles $<$.

L'ensemble des solutions situées dans l'intervalle $]0, 1[$ est $S_g :=]\frac{1}{1+\varepsilon}, 1[$.

• À droite de $a = 1$:

$$|\sqrt{x} - 1| < \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \varepsilon < \sqrt{x} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} (1 - \varepsilon)^2 < x < (1 + \varepsilon)^2 & \text{si } 0 < \varepsilon < 1 \\ 0 \leq x < (1 + \varepsilon)^2 & \text{si } \varepsilon \geq 1. \end{cases}$$

(Représenter graphiquement $\sqrt{\cdot}$ pour mieux comprendre la distinction de cas.)

Dans tous les cas, l'ensemble des solutions situées dans l'intervalle $[1, +\infty[$ est $S_d := [1, (1 + \varepsilon)^2[$.

3. On conclut en proposant un intervalle centré en $a = 1$ situé dans l'ensemble des solution

$$S = S_g \cup S_d =]\frac{1}{1+\varepsilon}, (1 + \varepsilon)^2[.$$

On propose la condition $x \in]1 - \eta, 1 + \eta[$ avec $\eta = \min(1 - \frac{1}{1+\varepsilon}, (1 + \varepsilon)^2 - 1)$.

$$x \in]1 - \eta, 1 + \eta[\Rightarrow |x - 1| < \eta \Rightarrow x \in S \Rightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon$$

Chapitre 4. Exercice A.2.8

1. Soit f une fonction définie sur $\mathbf{D}$. Par hypothèse f admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ en x_0 , ce qui signifie

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_1 > 0, \forall x \in \mathbf{D} \setminus \{x_0\} \left(|x - x_0| < \eta_1 \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon \right).$$

On devine assez aisément que dans ce cas, la fonction $|f| : x \mapsto |f(x)|$ admet une limite en x_0 égale à $|\ell|$. Nous devons donc montrer que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_2 > 0, \forall x \in \mathbf{D} \setminus \{x_0\} \left(|x - x_0| < \eta_2 \Rightarrow ||f(x)| - |\ell|| < \varepsilon \right).$$

• Pour cela, il suffit de démontrer l'inégalité suivante : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ||a| - |b|| \leq |a - b|$.

Pour ce faire, on démontre plutôt $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ||a| - |b||^2 \leq |a - b|^2$, puis on applique la fonction $\sqrt{\cdot}$ qui est croissante.

preuve : Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Comme $|a|^2 = a^2$, on obtient

$$||a| - |b||^2 = (|a| - |b|)^2 = |a|^2 - 2|a||b| + |b|^2 = a^2 - 2|ab| + b^2$$

$$|a - b|^2 = (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Comme $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq |x|$, on peut écrire avec $x = ab$

$$ab \leq |ab| \Rightarrow -|ab| \leq -ab \Rightarrow -2|ab| \leq -2ab \Rightarrow a^2 - 2|ab| + b^2 \leq a^2 - 2ab + b^2.$$

On a bien

$$||a| - |b||^2 \leq |a - b|^2 \Rightarrow \sqrt{(|a| - |b|)^2} \leq \sqrt{(a - b)^2} \Rightarrow ||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

• Conclusion : Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, $\exists \eta_1 > 0, \forall x \in \mathbf{D} \setminus \{x_0\} \left(|x - x_0| < \eta_1 \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon \right)$.

En choisissant $\eta_2 = \eta_1$ on obtient

$$|x - x_0| < \eta_2 \Rightarrow |x - x_0| < \eta_1 \Rightarrow ||f(x)| - |\ell|| \leq |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

□

2. La réciproque est fausse.

Contre-exemple : on peut prendre la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

La fonction $|f|$ est la fonction constante égale à 1 sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ donc elle admet une limite en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ alors que la fonction f n'admet pas de limite en $x_0 = 0$ (les limites à gauche et à droite sont différentes).

Chapitre 4. Exercice A.2.10

1. Le sens « $\Rightarrow$ » est trivial : $\forall \varepsilon > 0, |a| = 0 < \varepsilon$.

Pour démontrer l'autre sens « $\Leftarrow$ », on peut démontrer la contraposée :

$$a \neq 0 \Rightarrow \exists \varepsilon > 0, |a| \geq \varepsilon .$$

preuve : soit $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, on pose $\varepsilon = |a|$. Alors, $\varepsilon > 0$ (car $a \neq 0$) et $|a| = \varepsilon \Rightarrow |a| \geq \varepsilon$.

2. On dit que f est une fonction périodique si

$$\exists T > 0, \forall n \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x + nT) = f(x).$$

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On doit montrer que « f est périodique et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \ell$ ».

preuve : • On sait que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R} (x > A \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon) .$$

Ceci se réécrit $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \in]A, +\infty[, |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

• Soit $x \in]-\infty, A]$ et soit $T > 0$ la période de la fonction f . On pose $X = \frac{A-x}{T}$. D'après la propriété d'Archimède, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > X$. On obtient

$$n > \frac{A-x}{T} \Rightarrow x + nT > A \Rightarrow |f(x + nT) - \ell| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon .$$

On en déduit que $\forall x \in]-\infty, A], |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

• Finalement, $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x) - \ell| < \varepsilon$. D'après la question 1., on en déduit que $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x) - \ell| = 0$ et donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \ell$. La fonction f est constante.

Chapitre 4. Exercice A.2.1 À finir