

# Chapitre 1. Corrigés des exercices.

**Exercice A.2.18 :** Respecter le symbole "supérieur stricte".

**1.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on énonce la phrase  $P(n) := \ll 2^n > n \gg$ .

Initialisation à  $n = 0$ .  $2^n = 2^0 = 1 > n = 0$  donc  $P(0)$  est vraie.

Hérédité. Pour  $n \geq n_0$  fixé, on montre que  $P(n) \Rightarrow P(n+1)$  est vraie.

**correction.**  $2^{n+1} = 2^n + 2^n$ . Par hypothèse de récurrence,  $2^n > n$  donc on a  $2^{n+1} > 2n$ . Pour conclure, on utilise le résultat  $n \geq 1 \Leftrightarrow 2n \geq n+1$ . En concaténant les résultats on aboutit à  $2^{n+1} > n+1$ .

On a donc démontré l'hérédité pour  $n \geq n_0 = 1$ . Nous devons donc vérifier que  $P(1)$  est vraie également.

Initialisation à  $n = 1$ .  $2^n = 2^1 = 2 > n = 1$  donc  $P(1)$  est vraie.

Conclusion :  $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n > n$ .

### Exercice A.2.19.

#### 1. Hérédité de $(P(n))_{n \in \mathbb{N}}$ .

Soit  $n \geq 0$ . On montre que  $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ .

On suppose que  $P(n) :=$  « le nombre  $A_n = 3^{2n+2} - 2^{n+1}$  est divisible par 7 » est vraie.

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= 3^{2(n+1)+2} - 2^{(n+1)+1} = 3^2 \times 3^{2n+2} - 2^1 \times 2^{n+1} \\ &= 9 \times 3^{2n+2} - 2 \times 2^{n+1} = \underbrace{7 \times 3^{2n+2}}_{\text{divisible par 7}} + 2(3^{2n+2} - 2^{n+1}). \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence, le nombre  $(3^{2n+2} - 2^{n+1})$  est divisible par 7 donc  $A_{n+1}$  aussi.

#### Hérédité de $(Q(n))_{n \in \mathbb{N}}$ .

Soit  $n \geq 0$ . On montre que  $Q(n) \Rightarrow Q(n+1)$ .

On suppose que  $Q(n) :=$  « le nombre  $B_n = 3^{2n+2} + 2^{n+1}$  est divisible par 7 » est vraie.

$$\begin{aligned} B_{n+1} &= 3^{2(n+1)+2} + 2^{(n+1)+1} = 3^2 \times 3^{2n+2} + 2^1 \times 2^{n+1} \\ &= 9 \times 3^{2n+2} + 2 \times 2^{n+1} = \underbrace{7 \times 3^{2n+2}}_{\text{divisible par 7}} + 2(3^{2n+2} + 2^{n+1}). \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence, le nombre  $(3^{2n+2} + 2^{n+1})$  est divisible par 7 donc  $B_{n+1}$  aussi.

2. Oui avec  $n_0 = 0$ . On vérifie que  $P(0)$  est vraie.

$$A_0 = 3^2 - 2^1 = 9 - 2 = 7.$$

3. Non, il n'existe aucune valeur  $n_0 \in \mathbb{N}$  pour initialiser la récurrence.

On peut affirmer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ , non  $Q(n)$ . On raisonne par l'absurde.

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $Q(n)$  est vraie. Alors  $A_n$  et  $B_n$  sont tous deux divisible par 7. La différence  $B_n - A_n$  est donc divisible par 7 :

$$\exists k \in \mathbb{N}, B_n - A_n = 2 \times 2^{n+1} = 7k.$$

Ceci est absurde car 2 est le seul diviseur premier de  $B_n - A_n$ .

La négation est fausse donc la phrase  $\forall n \in \mathbb{N}$ , non  $Q(n)$  est vraie.

**Exercice A.2.13 :** À faire par double implication

1. On montre tout d'abord que  $n$  impair et  $p$  impair  $\Rightarrow np$  impair.

dém : Soit  $n = 2k + 1$  et  $p = 2k' + 1$  avec  $kk' \in \mathbb{N}$ . Alors,

$$np = (2k + 1)(2k' + 1) = 4kk' + 2k + 2k' + 1 = 2(2kk' + k + k') + 1 = 2q + 1 \quad \text{avec } q = 2kk' + k + k' \in \mathbb{N}.$$

On en déduit que  $np$  est impair.

2. Pour l'implication réciproque  $np$  impair  $\Rightarrow n$  impair et  $p$  impair, on montre plutôt la contraposée

$$n \text{ pair ou } p \text{ pair} \Rightarrow np \text{ pair.}$$

dém : On démontre tout d'abord que  $n$  pair  $\Rightarrow np$  pair. Soit  $n = 2k$  avec  $k \in \mathbb{N}$  et  $p \in \mathbb{N}$ . Alors,

$$np = 2k \times p = 2kp = 2q \quad \text{avec } q = kp \in \mathbb{N}.$$

On en déduit que  $np$  est pair.

Par symétrie (entre  $n$  et  $p$ ), la proposition  $p$  pair  $\Rightarrow np$  pair est également vraie.

3. L'équivalence est démontrée.

**Exercice A.2.23.**

1.  $P := \exists(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket, i \neq j \text{ et } |x_i - x_j| \leq \frac{1}{n}$ .

2.  $\forall(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket, i = j \text{ ou } |x_i - x_j| > \frac{1}{n}$ .

3. On montre que *non P* est fausse :

On sait que  $0 \leq x_0 \leq x_n \leq 1$  donc  $x_n - x_0 \leq 1$ .

Ensuite on décompose la différence  $x_n - x_0$  comme suit

$$x_n - x_0 = \underbrace{(x_n - x_{n-1}) + \cdots + (x_2 - x_1) + (x_1 - x_0)}_{\text{il y a bien } n \text{ termes}}$$

D'après le 2. on obtient

$$x_n - x_0 > n \times \frac{1}{n} = 1.$$

On a  $x_n - x_0 \leq 1$  et  $x_n - x_0 > 1$  ce qui est absurde.

La négation est fausse donc la proposition  $P$  est vraie.

**Exercice A.2.20.**

1. Avec schéma, on conjecture que  $B \subset C$ .

2. Pour démontrer une inclusion, on démontre l'implication  $\boxed{x \in B \Rightarrow x \in C}$ .

Les hypothèses sont ①  $(A \cap B) \subset (A \cap C)$  et ②  $(A \cup B) \subset (A \cup C)$ .

$$x \in B \Rightarrow x \in (A \cup B) \stackrel{\textcircled{2}}{\Rightarrow} x \in A \cup C \Rightarrow (x \in A) \text{ ou } (x \in C)$$

On continue par disjonction de cas :

- Si  $x \in A$  alors  $x \in A \cap B$ . D'après ①, alors  $x \in A \cap C \subset C$ .
- Si  $x \in C$ , la démonstration est finie.

Conclusion : On a bien  $B \subset C$ .

**Exercice A.2.22.**

1.

$$\begin{aligned}(x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D) &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times C \text{ et } (x, y) \in B \times D \\ &\Leftrightarrow x \in A \text{ et } y \in C \text{ et } x \in B \text{ et } y \in D \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap B \text{ et } y \in C \cap D \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D)\end{aligned}$$

2. Non. Reasonner dans  $E = F = \mathbb{R}$ .

Prenons  $A = C = \{0\}$ ,  $B = D = \{1\}$ . On a

$$(A \times C) \cup (B \times D) = \{(0, 0); (1, 1)\},$$

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = \{(0, 0); (1, 1); (0, 1); (1, 0)\}.$$