

C Fonction cosinus :

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \cos x$.

La fonction f est infiniment continûment dérivable (de classe \mathcal{C}^∞).

On peut donc appliquer la formule de Taylor-Young à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ en $a = 0$.

Ainsi il existe une fonction ε telle que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + x^n\varepsilon(x), \text{ avec } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Or $\forall k \in \mathbb{N}$, $f^{(2k)}(x) = (-1)^k \cos x \Rightarrow f^{(2k)}(0) = (-1)^k$ et

$\forall k \in \mathbb{N}$, $f^{(2k+1)}(x) = (-1)^{k+1} \sin x \Rightarrow f^{(2k+1)}(0) = 0$.

$$\text{ordre 2 : } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$$

$$\text{ordre 3 : } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + x^3\varepsilon(x)$$

$$\text{ordre 4 : } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + x^4\varepsilon(x)$$

D Fonction sinus :

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \sin x$.

La fonction f est infiniment continûment dérivable (de classe \mathcal{C}^∞).

On peut donc appliquer la formule de Taylor-Young à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ en $a = 0$.

Ainsi il existe une fonction ε telle que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + x^n \varepsilon(x), \text{ avec } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \forall k \in \mathbb{N}, f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x &\Rightarrow f^{(2k)}(0) &= 0 \text{ et} \\ \forall k \in \mathbb{N}, f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x &\Rightarrow f^{(2k+1)}(0) &= (-1)^k. \end{aligned}$$

$$\text{ordre 2 : } \sin x = x + x^2 \varepsilon(x)$$

$$\text{ordre 3 : } \sin x = x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x)$$

$$\text{ordre 4 : } \sin x = x - \frac{x^3}{6} + x^4 \varepsilon(x)$$

E Fonction inverse :

Soit f la fonction définie sur $I =]-\infty, 1[$ par $f(x) = \frac{1}{1-x}$.

La fonction f est infiniment continûment dérivable (de classe \mathcal{C}^∞).

On peut donc appliquer la formule de Taylor-Young à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ en $a = 0 \in I$.

Ainsi **il existe une fonction ε telle que $\forall x < 1$,**

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + x^n\varepsilon(x), \text{ avec } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

$$\text{Or, } \begin{cases} f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \\ f'(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} \\ f''(0) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f^{(3)}(x) = \frac{6}{(1-x)^4} \\ f^{(3)}(0) = 6 = 3! \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{cases} f^{(k)}(x) = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}} \\ f^{(k)}(0) = k! \end{cases}$$

et

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^n\varepsilon(x)$$

NB : par changement de variable $t = -x$, on a $\forall t > -1$,

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \dots + (-t)^n + t^n\varepsilon(t)$$

F

 Fonction puissance (puissance non entière) :

Soit f la fonction définie sur $I =]-1, +\infty[$ par $f(x) = (1+x)^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$.

La fonction f est infiniment continûment dérivable (de classe \mathcal{C}^∞).

On peut donc appliquer la formule de Taylor-Young à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ en $a = 0 \in I$.

Ainsi il existe une fonction ε telle que $\forall x > -1$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + x^n \varepsilon(x), \text{ avec } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Or,

$$\begin{cases} f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\ f'(0) = \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \\ f''(0) = \alpha(\alpha-1) \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{cases} f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k} \\ f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1) \end{cases}$$

et

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + x^n \varepsilon(x)$$

Exemple classique : $f(x) = \sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}}$ à l'ordre 3 en $a = 0$.

$$\begin{aligned} \forall x > -1, \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \times \frac{\frac{1}{2}-1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \times \frac{\frac{1}{2}-1}{2} \times \frac{\frac{1}{2}-2}{3}x^3 + x^3 \varepsilon(x) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + x^3 \varepsilon(x). \end{aligned}$$

III Les infiniments petits

Definition

On dit que la fonction f (ou que $f(x)$) est un **infiniment petit au voisinage de a** si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Remarque : si f est définie et continue en a , alors la condition devient $f(a) = 0$.

Exemples : • Soit $f(x) = (x - a)^n$. Alors f est un inf^t petit au vois. de $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Leftrightarrow n \geq 1$.

• Soit $f(x) = \ln(1 + x)$ et $a = 0$. Alors ...

• Soit $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x}$ et $a = 0$. Alors ...

• Soit $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ et $a = 0$. Alors ...

• Soit $f(x) = \cos x$ et $a = \frac{\pi}{2}$. Alors ...

• Soit $f(x) = e^x$ et $a \neq 0$. Alors ...

Remarque : La définition s'étend au voisinage de $\pm\infty$.

Exemple : • Soit $f(x) = e^x$ en $-\infty$. Alors ...

Definition

Soit f un infiniment petit au voisinage de a telle que $\exists p \in \mathbb{N}^*$,

$$f(x) = \ell(x - a)^p + (x - a)^p \varepsilon(x - a) \quad \text{avec } \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

On dit que $f(x)$ est d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$. Le terme $\ell(x - a)^p$ est appelé **partie principale de l'inf^t petit $f(x)$ au vois. de a** . On dit que $f(x)$ est équivalent à sa partie principale au vois. de a , autrement dit :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\ell(x - a)^p} = 1.$$

Exemple 1 : Soit $f(x) = 1 - \cos(2x)$ au vois. de $a = 0$.

⋮

Exemple 2 : Soit $f(x) = x(\ln x)^2$ et $a = 1$.

⋮