

Chapitre 4. Exercice A.2.6 Soient $a > 0$ et $b > 0$.

1. On utilise la caractérisation de la fonction partie entière :

$$\forall X \in \mathbb{R}, X - 1 < E(X) \leq X.$$

Pour $x \neq 0$ et $X = \frac{b}{x}$, on obtient $\frac{b}{x} - 1 < E\left(\frac{b}{x}\right) \leq \frac{b}{x}$.

$$x > 0 \Rightarrow \frac{x}{a} \times \left(\frac{b}{x} - 1\right) < \frac{x}{a} \times E\left(\frac{b}{x}\right) \leq \frac{x}{a} \times \frac{b}{x} \Rightarrow \frac{b}{a} - \frac{x}{a} < f_1(x) \leq \frac{b}{a}$$

$$x < 0 \Rightarrow \frac{x}{a} \times \left(\frac{b}{x} - 1\right) > \frac{x}{a} \times E\left(\frac{b}{x}\right) \geq \frac{x}{a} \times \frac{b}{x} \Rightarrow \frac{b}{a} - \frac{x}{a} > f_1(x) \geq \frac{b}{a}$$

Puisque $\frac{b}{a} - \frac{x}{a} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{b}{a}$, on en déduit grâce au théorème des gendarmes que $f_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{b}{a}$.

2. Il faut étudier la fonction f_2 sur les intervalles $] -a, 0[$ et $]0, a[$.

• Si $x \in]0, a[$, alors $\frac{x}{a} \in]0, 1[$ et $E\left(\frac{x}{a}\right) = 0$. Par conséquent $\forall x \in]0, a[$, $f_2(x) = 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = 0.$$

• Si $x \in] -a, 0[$, alors $\frac{x}{a} \in] -1, 0[$ et $E\left(\frac{x}{a}\right) = -1$. Par conséquent

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{b}{x} = +\infty.$$

conclusion : la limite à droite existe mais la limite à gauche n'existe pas donc la fonction f_2 n'admet pas de limite en 0.

Chapitre 4. Exercice A.2.4

1. $\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \times x \sin \frac{1}{x}$.

On a $\frac{x}{\sin x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$. De plus $\sin \frac{1}{x}$ est borné sur \mathbb{R}^* donc $x \sin \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

On en déduit que $\frac{x}{\sin x} \times x \sin \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 0 = 0$.

3. • La limite est indéterminée en $+\infty$, on utilise la méthode du conjugué :

$$x+2-\sqrt{x^2+4x} = \frac{(x+2-\sqrt{x^2+4x})(x+2+\sqrt{x^2+4x})}{x+2+\sqrt{x^2+4x}} = \frac{(x+2)^2 - (x^2+4x)}{x+2+\sqrt{x^2+4x}} = \frac{4}{x+2+\sqrt{x^2+4x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

• En $-\infty$ on obtient directement le résultat

$$x+2-\sqrt{x^2+4x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty.$$

5. Il faut écrire pour $x > 0$: $x-2 = (\sqrt{x}-\sqrt{2})(\sqrt{x}+\sqrt{2})$. On obtient

$$\frac{x-\sqrt{2x}}{x-2} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-\sqrt{2})}{(\sqrt{x}-\sqrt{2})(\sqrt{x}+\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

7. On utilise le résultat $\frac{\sin X}{X} \xrightarrow{X \rightarrow 0} 1$ pour $X = 2x$ et $X = 3x$.

$$\begin{aligned} \frac{\sin 2x}{\tan 3x} &= \sin 2x \times \cos 3x \times \frac{1}{\sin 3x} = \frac{\sin 2x}{2x} \times 2x \times \cos 3x \times \frac{3x}{\sin 3x} \times \frac{1}{3x} \\ &= \frac{\sin 2x}{2x} \times \cos 3x \times \frac{3x}{\sin 3x} \times \frac{2}{3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Exercice supplémentaire. Démontrer, à l'aide de la définition avec quantificateurs, que la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } 0 < x < 1 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

admet une limite finie quand $x \rightarrow 1$.

1. Représenter graphiquement cette fonction. On rappelle la définition de la limite.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]0, +\infty[, (|x - 1| < \eta \Rightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon).$$

2. Soit $\varepsilon > 0$ fixé. On doit commencer par résoudre l'inégalité $|f(x) - 1| < \varepsilon$.

Ici on doit le faire deux fois :

• À gauche de $a = 1$:

$$\left| \frac{1}{x} - 1 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \varepsilon < \frac{1}{x} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{1-\varepsilon} > x > \frac{1}{1+\varepsilon} & \text{si } 0 < \varepsilon < 1 \\ x > \frac{1}{1+\varepsilon} & \text{si } \varepsilon \geq 1. \end{cases}$$

L'application de la fonction inverse change le sens des symboles $<$.

L'ensemble des solutions situées dans l'intervalle $]0, 1[$ est $S_g :=]\frac{1}{1+\varepsilon}, 1[$.

• À droite de $a = 1$:

$$|\sqrt{x} - 1| < \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \varepsilon < \sqrt{x} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} (1 - \varepsilon)^2 < x < (1 + \varepsilon)^2 & \text{si } 0 < \varepsilon < 1 \\ 0 \leq x < (1 + \varepsilon)^2 & \text{si } \varepsilon \geq 1. \end{cases}$$

(Représenter graphiquement $\sqrt{\cdot}$ pour mieux comprendre la distinction de cas.)

Dans tous les cas, l'ensemble des solutions situées dans l'intervalle $[1, +\infty[$ est $S_d := [1, (1 + \varepsilon)^2[$.

3. On conclut en proposant un intervalle centré en $a = 1$ situé dans l'ensemble des solution

$$S = S_g \cup S_d =]\frac{1}{1+\varepsilon}, (1 + \varepsilon)^2[.$$

On propose la condition $x \in]1 - \eta, 1 + \eta[$ avec $\eta = \min(1 - \frac{1}{1+\varepsilon}, (1 + \varepsilon)^2 - 1)$.

$$x \in]1 - \eta, 1 + \eta[\Rightarrow |x - 1| < \eta \Rightarrow x \in S \Rightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon$$

Chapitre 4. Exercice A.2.8

1. Soit f une fonction définie sur \mathbf{D} . Par hypothèse f admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ en x_0 , ce qui signifie

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_1 > 0, \forall x \in \mathbf{D} \setminus \{x_0\} \left(|x - x_0| < \eta_1 \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon \right).$$

On devine assez aisément que dans ce cas, la fonction $|f| : x \mapsto |f(x)|$ admet une limite en x_0 égale à $|\ell|$. Nous devons donc montrer que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_2 > 0, \forall x \in \mathbf{D} \setminus \{x_0\} \left(|x - x_0| < \eta_2 \Rightarrow \left| |f(x)| - |\ell| \right| < \varepsilon \right).$$

• Pour cela, il suffit de démontrer l'inégalité suivante : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \left| |a| - |b| \right| \leq |a - b|$.

Pour ce faire, on démontre plutôt $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \left| |a| - |b| \right|^2 \leq |a - b|^2$, puis on applique la fonction $\sqrt{\cdot}$ qui est croissante.

preuve : Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Comme $|a|^2 = a^2$, on obtient

$$\left| |a| - |b| \right|^2 = (|a| - |b|)^2 = |a|^2 - 2|a||b| + |b|^2 = a^2 - 2|ab| + b^2$$

$$|a - b|^2 = (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Comme $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq |x|$, on peut écrire avec $x = ab$

$$ab \leq |ab| \Rightarrow -|ab| \leq -ab \Rightarrow -2|ab| \leq -2ab \Rightarrow a^2 - 2|ab| + b^2 \leq a^2 - 2ab + b^2.$$

On a bien

$$\left| |a| - |b| \right|^2 \leq |a - b|^2 \Rightarrow \sqrt{\left(|a| - |b| \right)^2} \leq \sqrt{(a - b)^2} \Rightarrow \left| |a| - |b| \right| \leq |a - b|.$$

• Conclusion : Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, $\exists \eta_1 > 0, \forall x \in \mathbf{D} \setminus \{x_0\} \left(|x - x_0| < \eta_1 \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon \right)$.

En choisissant $\eta_2 = \eta_1$ on obtient

$$|x - x_0| < \eta_2 \Rightarrow |x - x_0| < \eta_1 \Rightarrow \left| |f(x)| - |\ell| \right| \leq |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

□

2. La réciproque est fautive.

Contre-exemple : on peut prendre la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

La fonction $|f|$ est la fonction constante égale à 1 sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ donc elle admet une limite en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ alors que la fonction f n'admet pas de limite en $x_0 = 0$ (les limites à gauche et à droite sont différentes).

Chapitre 4. Exercice A.2.1

Les fonctions sont définies sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. On a la CNS suivante

$$f \text{ admet une limite } \ell \text{ en } 0 \Leftrightarrow \forall (x_n), \left(x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ et } x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell \right)$$

1. La contraposée de \Rightarrow devient

$$\exists (x_n), \left(x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ et } x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ et } (f(x_n)) \text{ diverge} \right) \Rightarrow f \text{ n'admet pas de limite en } 0$$

ou bien

$$\exists (x_n), \exists (x'_n), \left(\begin{array}{l} x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ et } x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ et } f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_1 \\ x'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ et } x'_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ et } f(x'_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_2 \\ \text{et } \ell_1 \neq \ell_2 \end{array} \right) \Rightarrow f \text{ n'admet pas de limite en } 0$$

• Pour $f_1(x) = \sin \frac{1}{x}$ on prend la suite (x_n) définie par $x_n = \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{2}}$ pour $n \geq 0$.

On a bien $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f(x_n) = (-1)^n$. La suite $(f(x_n))$ diverge.

• Pour $f_2(x) = \cos \frac{1}{x}$, on prend la suite (x_n) définie par $x_n = \frac{1}{n\pi}$ pour $n \geq 1$.

On a bien $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f(x_n) = (-1)^n$. La suite $(f(x_n))$ diverge.

• Pour $f_3(x) = \frac{x}{|x|} \cos x$, on prend la suite (x_n) définie par $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ pour $n \geq 1$.

On a bien $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f(x_n) = (-1)^n \cos \frac{1}{n}$ (\cos est paire). Il y a deux méthodes pour montrer la divergence de $(f(x_n))$:

méthode 1 : On raisonne par l'absurde :

On suppose que $(f(x_n))$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$. Dans ce cas les suites $(f(x_{2n}))$ et $(f(x_{2n+1}))$ convergent vers la même limite ℓ également. Comme $f(x_{2n}) = \cos \frac{1}{2n}$ et $f(x_{2n+1}) = -\cos \frac{1}{2n+1}$ on en déduit que $(f(x_{2n}))$ et $(f(x_{2n+1}))$ convergent vers 1 et -1 respectivement, contradiction.

méthode 2 : On pose $u_n = (-1)^n$. On étudie la convergence de $f(x_n) - u_n = (-1)^n (\cos \frac{1}{n} - 1)$.

La suite de terme général $(-1)^n$ est bornée et $\cos \frac{1}{n} - 1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Donc d'après le corollaire 2 du Théorème des gendarmes, on en déduit que $f(x_n) - u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Maintenant, on raisonne par l'absurde : on suppose que $(f(x_n))$ converge et on écrit $(-1)^n = f(x_n) - (-1)^n (\cos \frac{1}{n} - 1)$. D'après les opérations sur les suites convergentes, on en déduit que $(-1)^n$ converge ce qui est faux. Donc la suite $(f(x_n))$ diverge.

ou bien

• Pour $f_1(x) = \sin \frac{1}{x}$ on prend deux suites (x_n) et (x'_n) définies par $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ et $x'_n = \frac{1}{(n+1)\pi}$ pour $n \geq 0$. On a bien $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f_1(x_n) = 1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_1 = 1$, et aussi $x'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $x'_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f_1(x'_n) = 0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_2 = 0 \neq \ell_1$. La fonction f_1 n'a donc pas de limite en 0.

• Pour $f_2(x) = \cos \frac{1}{x}$, on prend deux suites (x_n) et (x'_n) définies par $x_n = \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{2}}$ et $x'_n = \frac{1}{2n\pi + \pi}$ pour $n \geq 0$. On a bien $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f_2(x_n) = 0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_1 = 0$, et aussi $x'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $x'_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f_2(x'_n) = -1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_2 = -1 \neq \ell_1$. La fonction f_2 n'a donc pas de limite en 0.

• Pour $f_3(x) = \frac{x}{|x|} \cos x$, on prend deux suites (x_n) et (x'_n) définies par $x_n = \frac{1}{n}$ et $x'_n = -\frac{1}{n}$ pour $n \geq 0$. On a bien $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0^+$ et $x_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f_3(x_n) = +\cos(\frac{1}{n}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_1 = 1$, et aussi $x'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0^-$ et $x'_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $f_3(x'_n) = -\cos(-\frac{1}{n}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell_2 = -1 \neq \ell_1$. La fonction f_3 n'a donc pas de limite en 0.